


**PALEOZOICO (Pérmico)**

Estado Falcón

Referencia original: W. M. MacDonald, 1968, p. 451.

Consideraciones históricas: Mac Donald (1968) utilizó esta denominación, para designar un cuerpo intrusivo granítico que aflora a corta distancia, al oeste de Pueblo Nuevo, región central de la península de Paraguaná. Anteriormente, Pérez Mena (1967) había mencionado ya un granito muy meteorizado, sin entrar en mayores detalles petrológicos. Feo Codecido (1968 y 1971) publica breves descripciones del plutón y aporta las únicas dataciones radimétricas del mismo. Rodríguez (1969) realiza un detallado estudio de la alteración hidrotermal del Complejo Igneo - Metamórfico de Pueblo Nuevo y publica en 1985 un estudio sobre la formación de granito, económicamente explotable en la zona de contacto de la intrusión, en la Formación Pueblo Nuevo.

Localidad tipo: Quebrada El Amparo, a 5 km al suroeste de Pueblo Nuevo y a 2 km al este de San José de Cocodite, área central de la península de Paraguaná, distrito Falcón, estado Falcón (Hoja 6251, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción petrológica: MacDonald (*op. cit.*) describe un granito hornabléndico biotítico, cataclástico, y levemente metamorfizado (sausuritizado), que intrusióna la Formación Pueblo Nuevo del Jurásico Superior y que se halla rodeado de una angosta zona de metamorfismo de contacto. Martín Bellizzia (1968) cataloga la intrusión, como una meta-granodiorita. Rodríguez (*op. cit.*) lo describe como un granito de grano grueso, de colores claros, frecuentemente verdosos debido a la alta concentración de los máficos hornablenda, biotita y epídoto; como componentes principales menciona además, microclino, plagioclasa y cuarzo y como accesorios, apatito, esfena, circón y granate. Evidentemente, los diferentes estudios petrográficos disponibles son insuficientes para caracterizar el plutón. Este último autor menciona además diques aplíticos y segregaciones pegmatíticas dentro del cuerpo y diques de pórfidos hornabléndico-feldespáticos y cuarzo-feldespáticos, como satélites externos que cortan la Formación Pueblo Nuevo. Martín Bellizzia (*op. cit.*) se refiere a unos diques basálticos intrusivos y Feo Codecido (*op. cit.*) habla de diques ácidos graníticos y riolíticos. Rodríguez (*op. cit.*) describe pseudogneises (granitos gnéisicos) que conforman el borde de contacto del plutón, y es de apenas 3 m de espesor.

Ambiente tectónico y petrogénesis: De acuerdo a MacDonald (*op. cit.*) el bajo grado metamórfico y la poca extensión de la aureola metamórfica de contacto, indican que el Meta-Granito de El Amparo es un plutón epizonal, emplazado a poca profundidad. Sufrió un período de deformación y de leve metamorfismo, a fines o inmediatamente después de su emplazamiento.

Contactos: Según MacDonald (*op. cit.*) Plutón de El Amparo intrusióna la Formación Pueblo Nuevo, con desarrollo de una estrecha aureola de metamorfismo de contacto de 10 m o menos. Martín Bellizzia (*op. cit.*), por el contrario, opina que los contactos son discordantes y de falla, con rocas mesozoicas suprayacentes (Formación Pueblo Nuevo). Feo Codecido (*op. cit.*) se refiere a un complejo granítico de "proporciones batolíticas indeterminadas", pero que sí intrusióna a una secuencia de esquistos y gneises en la Mesa de Cocodite.

Extensión geográfica: El Plutón de El Amparo sólo aflora en la Mesa de Cocodite, en una zona equidistante entre los poblados Pueblo Nuevo y San José de Cocodite, Paraguaná central. MacDonald (*op. cit.*) menciona un ancho de 8 km.

Edad: Debido a su condición supuestamente intrusiva en la Formación Pueblo Nuevo del Jurásico Superior, MacDonald (*op. cit.*) propone una edad cretácica para el evento magmático. Las dataciones radimétricas realizadas por la Shell Development Company en Texas (en Feo-Codecido, 1971), mediante el método U/Pb en esfena, proporcionaron una edad de 262 y 265 m.a., lo cual corresponde al Pérmico.

Correlación: Feo-Codecido (1971) establece relaciones estratigráficas y petrográficas "con intrusiones similares expuestas en el Macizo de El Baúl, isla de Toas, levantamiento de El Palmar (Perijá) y península de la Guajira, cuyas edades oscilan en los alrededores del Paleozoico Superior.

Importancia económica: De acuerdo con Rodríguez (*op. cit.*), la acción térmica del Plutón de El Amparo sobre sedimentos carbonáceos (Formación Pueblo Nuevo) habría generado las filitas grafitosas que presentan concentraciones, económicamente explotable de grafito.

Ilustraciones: [Mapa geológico de la Península de Paraguaná](#); [Afloramiento fresco del Granito El Amparo](#).

© P. Moticska N., 1997

Referencias

Feo-Codecido, G., 1968. Geología y recursos naturales de la Península de Paraguaná, Venezuela, *CICAR Coloquio I*, Curazao.

Feo-Codecido, G., 1971. Guía de Excursión: Península de Paraguaná, Estado Falcón, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. 5, 1:304-315.

MacDonald, W. D., 1968. Estratigrafía, estructura y metamorfismo, de las rocas del Jurásico Superior, Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol.*, (18): 441-458.

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas, *Bol. Geol.*, (19): 356-380.

Pérez Mena, R., 1967. Recursos de aguas subterráneas, Península de Paraguaná, Estado Falcón, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 2(1): 35-56.

Rodríguez, S., 1969. Estudio sobre la alteración hidrotermal presente en el Complejo Igneo-Metamórfico de Pueblo Nuevo, Edo. Falcón, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 4(2).

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Rodríguez, S., 1985. Características de los depósitos comerciales de grafito del borde norte de América del Sur, *Mem. IV Cong. Lat. Geol.*, 3: 23-34.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)