




NEOGENO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: Kavanagh de Petzall, 1959, p. 276.

Consideraciones históricas: Kavanagh de Petzall (1959) designó con este nombre al miembro inferior, de tres, de la Formación Caujarao, propuso su localidad tipo, y describió su litología característica y sección tipo en la región de la estructura de La Vela.

Vallenilla (1961) siguió esta misma subdivisión para la Formación Caujarao en su localidad tipo y la describió el Miembro El Muaco como el miembro calcáreo-arenoso.

Localidad tipo: Vertiente este de la quebrada El Muaco, distrito Colina, estado Falcón. (Hoja 6250, Cartografía Nacional, escala 1:100.000).

Descripción litológica: El intervalo consiste principalmente de arcillas y lutitas que constituyen un 80% de la unidad. Hacia la base se presentan calizas organógenas y detríticas fosilíferas, margas fosilíferas y areniscas friables de grano fino.

Espesor: En la sección tipo, el Miembro El Muaco tiene un espesor de 690 m (Kavanagh de Petzall, 1959). En el río Coro, Vallenilla (1961) midió 645 m.

Extensión geográfica: Se reconoce al sur de Coro y los alrededores de La Vela.

Contactos: Sus contactos, tanto inferior con la Formación Socorro, como superior con el Miembro Mataruca, son concordantes.

Fósiles: Tanto Kavanagh de Petzall (1959) como Vallenilla (1961) identifican una variada microfauna de foraminíferos. Wozniak y Wozniak (1987) hacen especial énfasis en los foraminíferos planctónicos.

Edad: Los conjuntos planctónicos indican una edad del tope del Mioceno Medio (Zona de *Globorotalia menardii*) para la parte más inferior del Miembro El Muaco, que pasa rápidamente hacia la base del Mioceno Tardío (Zona de *Globorotalia acostaensis*) dentro del mismo miembro (Wozniak y Wozniak, 1987).

Paleoambientes: El ambiente parece ser de plataforma, con influencias a veces más marinas, evidenciadas por la presencia de microfauna pelágica (Wozniak y Wozniak, 1987).

© E. Cabrera y G. Giffuni, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Petzall, C. K., 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10: 269-320.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

- Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.
- Gamero, G. y Díaz de Gamero L., 1963. Estudio sw una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, Estado Falcón. "Geos", *Univ. Cent. Venez.*, Caracas. (9): 7-44. Reimpreso 1963 en: *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(11): 329-367.
- Gonzalez de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.
- González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).
- Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 35(8): 1850-1878.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiaren orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und NordMarokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.
- Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(1): 65-81.
- Weingeist, 1956. Formación Caujarao en Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.. M. M. H.*, Pub. Esp. 728 p. 44.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)