




TERCIARIO (Mioceno Medio - Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1950-a. p. 1203.

Consideraciones históricas: Como indica el Léxico Estratigráfico de 1956, el nombre fue propuesto por E. E. Brossard y J. W. West en informe inédito de 1927; González de Juana (1938: "Discussions") fue el primero en publicar el nombre El Pilar "conglomerate" para identificar unos 3.050 m de clásticos gruesos que afloran en las montañas de El Pilar y San Bernardino, estado Anzoátegui. Hedberg (1936, *fide* Peirson, 1965-a) definió la localidad tipo en las cercanías del pueblo de El Pilar, distrito Bolívar, estado Anzoátegui, y la sección tipo en los cerros de San Bernardino desde un punto 9 km al sur de El Pilar en el camino hacia El Carrito. Hedberg (1950-a) describió la espesa acumulación conglomerática expuesta al norte de El Pilar, en Anzoátegui septentrional, como miembro inferior de la Formación Quiamare en el área. Los conglomerados son topográficamente prominentes y forman los cerros de San Bernardino, al oeste de Barcelona.

Salvador (1964-b) situó al Miembro El Pilar en la mitad superior de la Formación Quiamare, criterio secundado por González de Juana *et al.* (1980, fig. VI-82). Peirson (1965-a) detalló en forma precisa las características del miembro, notando que la enorme cuña es un "conglomerado orogénico" que refleja una sedimentación muy rápida de clásticos gruesos fluviales sobre una llanura de marea al sur de un levantamiento bajo activa erosión. También consideró el rango de la unidad, concluyendo que como miembro de la Formación Quiamare, los conglomerados representan un desarrollo específico de una formación de litología variable y tiene, por lo tanto, implicaciones importantes respecto a la historia sedimentaria de la región; su elevación al rango de formación solamente impediría entender sus relaciones estratigráficas con Quiamare.

Campos y Osuna (1977) y Vivas y Mactosay (1989), insisten en su posición basal dentro de la Formación Quiamare, encima de la discordancia angular que separa esta unidad de rocas más antiguas.

Según Vivas y Macsotay (1989), el miembro consiste de una secuencia monótona de arcilitas (75%-80%) con lentes y paquetes de conglomerados pudinga y areniscas (20%-25%), de color pastel, en los que domina el gris verdoso y el marrón. Los clastos de los conglomerados consisten mayormente de ftanitas o chert, calizas micríticas, areniscas calcáreas metavolcanitas, calizas macrofósilíferas y areniscas glauconíticas, procedentes de unidades Cretácicas y Paleógenas alóctonas o para-autóctonas.

Desde el desarrollo principal del miembro en la sección tipo, donde alcanza elevaciones de unos 570 m, los conglomerados desaparecen lentamente hacia el este y oeste por interdigitación lateral con los clásticos finos del Miembro Salomón de la Formación Quiamare. Normal al rumbo de las capas, se extiende unos 15 km desde Potoco, al norte, hasta Caigua al suroeste. Algunos "dedos" de conglomerados se extienden al este hasta la carretera Puerto La Cruz-El Tigre, y al oeste hasta estar truncada contra la Falla Guanape.

Su máximo espesor ha sido estimado en 4.570 m (Hedberg, 1950); 6.100 m de los cuales 4.652 m fueron medidos (Peirson, 1965-a) y 4.250 m Vivas y Macsotay, 1989). El espesor medido de 4250 m, fue parte de los argumentos de Campos *et al.* (1980), para proponer su ascenso a rango formacional, lo cual no tuvo aceptación entre autores posteriores. Este miembro constituye un lente de extensión subhectométrico en sentido este-oeste, observable desde la carretera Barcelona kilómetro 52 por el este, hasta el caserío El Alambre, sobre la carretera de la costa por el oeste (Vivas y Macsotay, 1989).

Faltando fósiles autóctonos, la edad del miembro se considera Mioceno Tardío por correlación lateral con el Miembro Salomón. (Vivas y Macsotay (1989, p. 112) reportaron la presencia de *Turritella mataruncana*, *T. plebeia plebeia*, *T. mimetes collinensis*, *Hemisimus picardi* en arcillitas, supuestamente del Miembro Salomón, suprayacente al Miembro El Pilar, los cuales asignan al Mioceno Tardío, parte inferior, en la carretera Santa Fé-Chaguaramas, reportaron a *Rhinoclavis (Ochetoclava) plebeia*, *Anadara zuliana*, *Zirphaea* sp. y *Martesia* sp., indicativos de la misma edad.

Véase [QUIAMARE, Formación](#); [SALOMON, Miembro](#).

Referencias

- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. Geology of the Boca de Uchire region. Sociedad Venezolana de Geólogos, Caracas, Venezuela, *V Congreso Geológico Venezolano*, 1: 449-467.
- Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de Montañas de la Serranía del Interior. estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.
- González de Juana, C., 1938-a. Contribución al estudio de la cuenca sedimentaria Zulía-Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 123-138.
- González de Juana, C., 1938-b. A contribution to the study of the Zulía-Falcón sedimentary basin. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 123-140 (ed. en inglés)
- González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.
- Hedberg, H. D., 1936. ???
- Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Direc. Geol., Caracas, Publ. Esp. N° 1: 728 p.
- Peirson III, A. L., 1965a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven: 337 p.
- Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.
- Vivas, V. y O. Macsotay, 1989. "Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, ejemplo de Molasa Orogénica Neogena de Venezuela Nororiental. 17 pp., *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Mayo, 1988.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 237-264.
- Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).
- Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)