

TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 74-76.

Esta constituye la unidad estratigráficamente más alta del esquema zonal aplicado por Renz (1948) al Grupo Agua Salada de Falcón oriental. Corresponde a la parte superior extrema (50-56 metros de espesor) del Miembro Huso de la Formación Pozón, y representa una variación lateral de aguas salobres de la Zona de *Robulus senni*, de ambiente marino. C. Petzall (1959) reconoció elementos de esta zónula en la parte superior de la Formación Caujarao; Vallenilla (1961) la correlacionó con la Zónula de *Streblus catesbyanus* en el miembro inferior de la Formación La Vela.

Referencias

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(10): 269-320.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Vallenilla L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, LA Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(12): 29-78.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces