


**PALEOZOICO TEMPRANO** (Cámbrico Tardío-Ordovícico)

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín Bellizzia, 1961, p. 1460.

Consideraciones históricas: Martín Bellizzia (1961) introdujo este nombre, para designar todas las rocas metasedimentarias que afloran en el Macizo de El Baúl, estado Cojedes y que ocupan un tercio de la superficie del macizo. Su localidad tipo es el hato El Barbasco, a unos 10 km al norte del pueblo de El Baúl, distrito Girardot, estado Cojedes, y se extiende, desde las inmediaciones de los cerros Barraguán y Bartolo al norte, hasta los cerros Galápagos y Cayetano, en los extremos suroccidental y suroriental del macizo. (Hojas 6542 y 6543, escala 1:100.000, Cartografía Nacional). Estas rocas habían sido mencionadas anteriormente por Liddle (1946), Bucher (1952), Patterson y Wilson (1953) y Rod (1955). Feo-Codecido (1955) publicó una breve descripción petrográfica de estos metasedimentos.

Martín Bellizzia (*op. cit.*) dividió el grupo en tres secciones: una sección inferior (Formación Mireles), que es esencialmente filítica y metalimolítica fosilífera, y aflora en la región de Mireles; una sección intermedia (Formación Cerrajón) cornubianítica, con intercalaciones de cuarcitas, estéril, expuesta en la parte central y norcentral del macizo; y una sección superior (Formación Cañaote) metasamítica, de grano medio a grueso, estéril, expuesta en el extremo suroriental de la región. El espesor conjunto del grupo es de unos 1.200 m. Sufrió un metamorfismo regional de bajo grado, al que se sobreimprimió localmente un metamorfismo de contacto, causado por intrusiones graníticas. El contacto inferior del grupo no es visible; el superior es discordancia y de falla con el Grupo Volcánico de Guacamayas. Las formaciones entre sí exhiben contactos concordantes y transicionales, y en algunos casos, son equivalentes laterales. El Granito de El Baúl, del Paleozoico tardío (275-287 m.a.) es intrusivo en las rocas de este grupo.

Sólo en la Formación Mireles se han encontrado fósiles. Se trata de trilobites de las especies *Olenellus thompsoni*, *Paedeumias* sp. y *Wanneria* sp. del Cámbrico temprano (Maync, 1956) y *Parabolina argentina* del Cámbrico tardío, al Ordovícico temprano (Tremadociense) (Frederickson, 1958).

Según Benedetto y Sánchez (1985), estos sedimentos se acumularon durante la fase de máxima apertura del océano Protoatlántico. El ambiente sedimentario de este grupo, se inicia con una depositación transicional de línea de playa a continental, bajo condiciones de plataforma inestable. Posteriormente, la sedimentación se hace enteramente continental (Martín Bellizzia, *op. cit.*).

El Grupo El Barbasco ha sido correlacionado con las formaciones Carrizal y Hato Viejo, del Cámbrico temprano-Ordovícico tardío (Liddle, *op. cit.*, Bucher, *op. cit.* y Feo-Codecido, *op. cit.*). Posteriormente, Martín Bellizzia (*op. cit.*) consideró que este grupo muestra afinidades con la parte inferior de la Formación Mucuchachí en los andes venezolanos, y con las formaciones Quétame y Guejar en Colombia.

Véase [CAÑAOTE, Formación](#); [CERRAJON, Formación](#); [MIRELES, Formación](#).

© P. Moticska, 1997

Referencias

Benedetto, G. y T. Sánchez, 1985. Modelo de desarrollo del Océano Protoatlántico en la región norte de sudamérica, *Transactios IV Latinam. Geol. Conf.*, 2: 825-844.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, p. 113.

Feo-Codecido, G., 1955. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.* (Venezuela), 3(8): 109-121.

Frederickson, E. A., 1958. Lower Tremadocian trilobite from Venezuela, *Jour. of Paleont.*, 32(3): 541-543.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2da. Ed., Paleont, Res. Inst., Ithaca, New York, p.890.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 3, 4: 1463-1530.

Maync, W., 1956. Mireles, Formación. Léxico Estratiráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. N° 1, p. 430-431.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(12): 2705-2733.

Rod, E., 1955. Trilobites in "metamorphic" rocks of El Baúl, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 39(9): 1865-1869.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. Mac Gowam, Fort Worth, Texas, p.552.

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotrópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Stover, L. E., 1967. Palynological dating of the Carrizal Formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(10): 288-302.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)