

CRETACICO (Campaniense-Maastrichtiense)

Estado Guárico

Referencia original: T. A. Konigsmark, 1965, p. 242.

Konigsmark (1965) introdujo este término para designar lentes de caliza de hasta 3 kilómetros de longitud y 150 metros de espesor, interestratificadas en lutitas de su Formación Piedras Azules. La roca es afanítica, con abundante foraminíferos planctónicos (*Guembelina*, *Globotrancana*, *Rugoglobigerina*) del Campaniense-Maastrichtiense. Estas capas parecen correlacionarse con calizas, no designadas formalmente, de la Formación Mucaria, mencionadas por Renz y Short (1960) y Jarvis (1966).

Referencias

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, Estados Cojedes y Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., I: 277-315.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)