

Formación detrítica de tipo molásico. Conglomerados con elementos líticos, mal escogidos, de gran tamaño 0.2 metros, con un origen exótico relativo a las rocas metamórficas de la Serranía del Interior. Elementos redondos, cuarzos y cuarcitas y angulares, esquistos. El cemento es arcillo-arenoso, de color gris amarillo o rojo.

No existen evidencias paleontológicas para definir edad, pero por correlaciones estratigráficas locales se sugiere una edad Pleistoceno.

El ambiente corresponde a un sistema complejo de abanicos piemontinos, intercalados con canales fluviales colmatados y sedimentos lacustres.

En río Carinicua, estado Sucre, es de edad Plioceno? a Cuaternario y es un conjunto molásico que se depositó en todo el norte de la Serranía del Interior oriental de Venezuela. El afloramiento estudiado está ubicado al sureste de Cariaco, al sur de Acequia. El espesor total medido es de 170 metros, en este sector.

La litología general está representada por una alternancia regular de arcillas y margas de color gris a beige, con niveles delgados de yeso. Esta formación se depositó sobre un socalo sedimentario erosionado, donde los primeros sedimentos rellenan un paleorelieve. Se observan bloques y olistolitos constituidos por elementos sedimentarios y/o metamórficos. El contenido fosilífero consiste en equinodermos, lamelibranquios y ostrácodos.

El ambiente es marino proximal con aporte detrítico del continente.

En el sector Cangrejal, Guatamare, estado Sucre, es una formación de tipo molásico que rellena las depresiones en el norte del sector de estudio. Son conglomerados con elementos líticos de gran tamaño.

M. Furrer y M. Castro, 1997

Referencias

Furrer, M. y M. Castro, 1997. *Nuevas unidades propuestas por AGUASUELOS INGENIERIA sobre datos inéditos de LAGOVEN S.A., en la cuenca oriental de Venezuela*, en prensa, 11 p.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)