




CRETACICO (Senoniense Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 13.

Esta zona fue establecida por Hedberg y Pyre (1944) y abarca la parte basal de su "Formación" Santa Anita en Anzoátegui nororiental, equivalente a la Formación San Juan y los 30 metros inferiores de la Formación Vidoño en la sección del río Querecual, y a la parte basal de la Formación Vidoño en la región de Barcelona. Estos autores asignaron una edad cretácica (Senoniense Tardío) a esta zona, a base de la presencia de *Guembelina excolata*, *Siphogenerinoides bramlettei*, *Siphogenerinoides cretacea*, y *Palmula* sp. Renz (1962) modificó posteriormente la zonación de la parte cretácica de la Formación Vidoño (Grupo Santa Anita) y estableció varias zonas y subzonas.

Referencias

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cushman, J. A., 1947. A foraminiferal fauna from the Santa Anita Formation of Venezuela. *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 23-1: 1-18.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst, Ithaca, N. Y., 890 p.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)