


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

**Referencia original:** R. L. Chase, 1965, p.159.

**Consideraciones históricas:** Chase (1965) designa con este nombre, a la roca oligoclásica - cuarzo - biotítica que forma numerosos plutones que intrusionan concordantemente a la Anfibolita de Panamo (sinónimo de Anfibolita de Carichapo), al sur de la falla de Guri, en la región de las Adjuntas - Panamo.

**Localidad tipo:** Río Guri, que fluye hacia el oeste en la región de La Adjuntas - Panamo. Hoja 7639, esc. 1.100.000, Cartografía Nacional.

**Descripción litológica:** La unidad contiene fases trondhjemiticas leucocráticas y melanocráticas, generalmente foliadas, particularmente en los plutones mayores. Ha sufrido cizallamiento extenso, con crecimiento de biotita a lo largo de los planos de cizallamiento y a través de la hornablenda. Los cristales de cuarzo y de feldespato están triturados y pulverizados a lo largo de dichos planos. Contiene como minerales esenciales: plagioclasa (45,7 a 56,1%) que puede ser oligoclasa o andesina, y cuarzo (26 a 41,5%), el feldespato potásico está ausente o se presenta en cantidades muy pequeñas (5%), la biotita en cantidades subordinadas, otros minerales ferromagnesianos, como anfíbol y diópsido, son escasos (0-3,5%). Contiene además, como accesorios, apatita, esfena, alanita, circón y óxidos de hierro. La leucotrndhjamita contiene un porcentaje por volumen de plagioclasa, similar a la melanotrndhjamita, pero tiene más cuarzo y carece de ferromagnesianos. La fase melanocrática es la más antigua y de aspecto gnéisico, como resultado de la segregación en bandas de minerales félsicos y de biotita. La fase leucocrática corta a la melanocrática. Estas dos son a su vez, cortadas por una tercera más leucocrática y de grano más grueso, con grandes cristales de plagioclasa gris azulada.

**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Chase (*op. cit.*) considera que el magma que originó la unidad, fué inyectado durante el plegamiento de la Anfibolita de Panamo (sinónimo de Anfibolita de Carichapo) y pudo haberse originado, como resultado, ya sea de fusión parcial de rocas de composición basáltica, con una relación alta de Na/K, como fundido granodiorítico, con cesión de potasio a la roca caja.

**Contactos:** La unidad forma cuerpos plutónicos concordantes, de hasta 12 m de longitud y 2 km de anchura, alargados paralelamente al rumbo regional este-noreste de las anfibolitas que intrusionan concordantemente.

**Extensión geográfica:** Según Chase (*op. cit.*), la unidad aflora unos 40 m al oeste de la localidad tipo, más allá del río Caroní y unos 15 km al sur del cerro Panamo. Al este, la reconoce hasta el área de Villa Lola, pero posiblemente se extienda más lejos aún en esa dirección.

**Edad:** Precámbrico. Chase (*op. cit.*) asignó a la unidad una edad mínima de 2.000 m.a., determinada por K/Ar en biotita. Gaudette *et al.* (1977), señalan una edad isocrona de  $2.817 \pm 57$  m.a. basada en mediciones Rb/Sr en roca rostral del Gneis Trondhjemitico de Pueblito de Espejo (1974) (sinónimo de la Trondhjemitita de Guri) y también deducen una edad de U/Pb de  $2.660 \pm 30$  m.a., a partir de circones procedentes de las mismas muestras. Klar (1978, en Ménendez, 1994) y Gibbs (1979) reinterpretan los datos aportados por Gaudette *et al.* (*op. cit.*) e indican que una edad Proterozoico Temprano para la unidad, es la más apropiada de acuerdo a la información que se cuenta.

**Sinonimia:** El Complejo de Gneis de carichapo de McClandless (1966) y el Gneis Tronhjemitico de Pueblito de Espejo (1974) son sinónimos de la unidad por su composición litológica, por tener la misma posición estratigráfica y una extensión geográfica semejante.

© A. Menéndez V., 1997

**Referencias**

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfibolita de Panamo y la Trondhjemitita de Guri: rocas Pre-Cámbricas del Cuadrilátero de las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.

Espejo, A., 1972. Técnica para la elaboración de mapas isopléticos, aplicación a un modelo geológico. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2201-2211.

Gaudette, *et al.*, 1977. ?????????????????????????????????

Gibbs, 1979. ?????????????????????????????????????????????????????????

McCandless, G. L., 1965. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del Estado Bolívar. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 19-28.

Menéndez V., A., 1994. ?????????????????????????????????????????????????????????

***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north-central del escudo de Guayana, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(11): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del escudo de Guayana, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 29-104.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 2a Edicion LEV                                                                    | Comentarios Recibidos                                                              |

 [REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)