




TERCIARIO (Oligoceno?)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1954, p. 2.

Cushman y Stainforth (1945) designaron la Zona de *Globigerina concinna* como la inferior extrema de sus tres divisiones faunales de la Formación Cipero de Trinidad. Stainforth (1948-a) amplió su descripción e indicó que la zona se reconoce principalmente por la presencia de *Globigerina* cf. *concinna*, restringida a este intervalo y que corrientemente se presenta por oleadas. Bolli (1954) describió la especie índice con el nombre de *Globigerina ciproensis* (nov.), diferente la *G. concinna* europea, y el nombre de la zona se alteró de acuerdo. Posteriormente, el mismo autor (1957-c) refinó la zonación de la Formación Cipero y también dividió su *Globigerina ciproensis* en tres subespecies. La Zona de *G. ciproensis* fue dividida en las tres zonas de *Globigerina ampliapertura*, *G. ciproensis ciproensis* y *Globorotalia opima opima*.

En Venezuela la presencia de la Zona de *G. ciproensis*, en sus sentidos tanto amplio como restringido, ha sido mencionada en la Formación Areo por Lagaaij (1963), Salvador (1964-a) y Lamb (1964-a), y en la parte inferior de la Formación Carapita en Pedernales por Barnola (1960). Bermúdez (1962) describió una rica microfauna de la Zona de *G. ampliapertura* en afloramientos cerca de Pedernales. Franklin (1944) mencionó *G. ciproensis* ("*G. concinna*") en la Formación Carapita en su región tipo, pero tanto Renz (1948), como Stainforth (1948-b) han expresado dudas al respecto, ya que parece probable que el material estudiado por Franklin incluía lutitas de la Formación Areo.

La edad de la Zona de *Globigerina ciproensis* (*sensu lato*) no se ha precisado todavía. Durante muchos años se aceptó como Oligoceno Temprano, pero la aceptación general de la edad miocena (Aquitaniense) de las zonas suprayacentes de *Catapsydrax dissimilis* y *Globigerinatella insueta*, comprime todo el Oligoceno dentro de los límites de esta única zona. Eames *et al.* (1962), llegaron a asegurar que el Oligoceno no está representado en la secuencia terciaria de Trinidad y Venezuela. Lagaaij (1963), a base de briozoarios lunulitiformes, ha sugerido independientemente que el tope del Oligoceno corresponde dentro de la parte inferior de la Zona de *G. opima opima*, o aproximadamente a medio nivel en la Zona de *G. ciproensis* (*sensu lato*).

Para el momento de la presente redacción, esta controversia ocupa la atención de paleontólogos en todo el mundo, y debe considerarse en estudio. En Venezuela, la Zona de *Globigerina ciproensis* (*sensu lato*) se ha considerado provisionalmente como representativa del Oligoceno, y la Zona de *Globigerina kugleri*, suprayacente, como incluyente del límite Oligoceno/Mioceno. Esta interpretación aparece en el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano del Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petról., 1963).

Referencias

- Barnola, A., 1960. Historia del Campo de Pedernales. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 552-573.
- Bermúdez, P. J., 1962. Foraminíferos de lutitas de Punta Tolete, Territorio Federal Delta Amacuro, Venezuela. "*Geos*", Univ. Cent. de Venez., Caracas (8): 35-38. Reimpreso en: RIVERO, F. CH. de Bermúdez, P. J., (1963) Micropaleontología general, (Univ. Cent. Venez., Caracas, 808 p.), apéndice, p. 765-768. Resumen en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(9): 263.
- Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 97-123.
- Cushman, J. A. y R. M. Stainforth, 1945. The foraminiferal fauna of the Cipero Marl Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res.*, Sp. Publ. 14, p. 3-75.
- Eames, FD. E., W. J. Clarke, F. T. Banner, A. H. Smout y W. H. Blow, 1968. Some larger foraminifera from the Tertiary of Central America. *Paleont.* (11): 283-305, pt. 2.
- Franklin, E. S., 1944. Microfauna from the Carapita Formation of Venezuela. *Jour. Paleont.*, 18(4): 301-319.

Lagaaij, R., 1963. CUPULADRIA CANARIENSIS (Busk)-Potait of a Bryozoan. *Paleontology*, VI-1: 172-217. Resumen (1963): *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(5):151-152.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Salvador A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(2): 53-64.

Stainforth, R. M., 1948-a. Description correlation and paleoecology of Tertiary Cipero Marl Formation, Trinidad, *B.W.I. Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(7): 1292-1330.

Stainforth, R. M., 1948-b. Applied micropaleontology in coastal Ecuador. *Jour. Paleont.*, 22(2): 113-151.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)