




**TERCIARIO** (Mioceno Tardío-Plioceno)

Estado Nueva Esparta

**Referencia original:** H. M. Bolli, 1966, p. 24.

Bolli y Bermúdez (1965) definieron la Zona de *Globorotalia dutertrei*-*Globigerinoides obliquus extremus* en la Formación Cubagua, con sección tipo en el pozo Cubagua-1 entre 1.435 y 2.432 pies, en la isla de Cubagua, estado Nueva Esparta. La zona se caracteriza por la extensión de *G. dutertrei* hasta la primera aparición de *G. margaritae*. Posteriormente, Bolli (1966) abrevió el nombre a Zona de *Globorotalia dutertrei*.

Los autores mencionados colocaron la zona en la parte inferior del Mioceno Tardío. Según los estudios más recientes (Cati *et al.*, 1968), corresponde a los niveles más jóvenes del Mioceno Tardío, con posible extensión al Plioceno Temprano.

### **Referencias**

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)