



TERCIARIO (Paleoceno)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, p. 99.

Renz (1962) estableció esta zona en la parte media de la Formación Vidoño en su localidad tipo. La unidad se caracteriza por la extensión vital de la especie titular, y fue subdividida, en orden ascendente, en las subzonas de *Globorotalia* cf. *pseudoscitula*, *Globigerina triloculinoides*, *Globigerinoides daubjergensis* y *Globigerina spiralis*. Su edad es principalmente Paleoceno, pero se observa la coexistencia de especies de *Rugoglobigerina* (Cretáceo) y *Globorotalia* (Paleoceno) en las capas basales. Según Renz, esta unidad incluye las zonas de *Globorotalia incinata* y *G. trinidadensis* y la Zónula de *Rzehakina epigona*, definidas por Bolli (1957-b).

Bolli (1966) aplicó el término en sentido más restringido, como equivalente a la *Zona de Globigerina pseudobulloides/Globigerina daubjergensis*", introducida por autores rusos en 1961.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 9(1): 3-32.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)