



TERCIARIO (Paleoceno)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-b, p. 63-64.

Bolli (1957-b) introdujo este nombre para designar un intervalo en la parte inferior (Paleoceno) de la Formación Lizard Springs de Trinidad. Entre otros criterios para su reconocimiento, las especies *Globorotalia pseudomenardii*, *G. tortiva* y *G. pusilla laevigata* se restringen a esta zona. Stanley (1960) mencionó la presencia de las dos primeras especies índices en la parte inferior de la Formación Vidoño, expuesta cerca de Puerto La Cruz, y por lo tanto estableció la presencia de la Zona de *G. pseudomenardii*, sin que se haya podido determinar su contacto preciso con la Zona de *G. velascoensis* suprayacente. En su descripción de la Formación Vidoño en la sección tipo del río Querecual, Renz (1962) aplicó una terminología zonal diferente, e introdujo la Subzona de *Globorotalia pseudomenardii* (de su Zona de *G. velascoensis*), con extensión equivalente a las Zonas de *G. pseudomenardii* y *G. velascoensis* de Bolli, tomadas en conjunto.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Stanley, D. F., 1960. Stratigraphy and foraminifera of Lower Tertiary Vidoño Shale, near Puerto La Cruz, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 44(5): 616-627.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)