




TERCIARIO (Paleoceno)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-b, p. 64.

Bolli (1957-b) estableció esta zona en la Formación Lizard Springs de Trinidad en la base del Eoceno Temprano, suprayacente a la Zona de *G. velascoensis*; mencionó la primera aparición en esta zona de ocho especies de *Globorotalia* y *Globigerina*, y la extinción, en el tope de la misma, de la especie *Globorotalia aequa*, de larga extensión. Este autor no reconoció la presencia de Eoceno Temprano en la Formación Vidoño de Venezuela oriental, debido a que según él, la facies no parece favorable para el estudio de foraminíferos planctónicos. Sin embargo, autores posteriores han identificado la Zona de *G. rex* en la Formación Vidoño: Stanley (1960), cerca de Puerto La Cruz y Renz (1962), en la sección tipo del río Querecual. Lamb (1964-b) mencionó la presencia de la especie índice a un nivel correspondiente en el río Aragua, estado Monagas, pero la colocó en la Formación Caratas, por suprayacer a la arenisca espesa inferior extrema en la sección.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the río Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(4): 111-123.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Stanley, D. F., 1960. Stratigraphy and foraminifera of Lower Tertiary Vidoño Shale, near Puerto La Cruz, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 44(5): 616-627.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)