




CRETACICO (Maastrichtiense)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-a, p. 53-54.

En la sección del río Querecual, Anzoátegui nororiental, Renz (1962) reconoció la Zona de *Globotruncana gansseri*, establecida por Bolli (1957-a) en el Maastrichtiense de Trinidad. Entre los numerosos foraminíferos planctónicos enumerados por Renz, las especies *Abathomphalus mayaroensis*, *Globigerinella messinae subcarinata*, *Globotruncana arca* y *Rugoglobigerina rugosa pennyi* se restringen a la zona.

Esta unidad incluye parte de la sección que Hedberg y Pyre (1944) incluyeron originalmente en su Zona de *Gumbelina-Siphogenerinoides*.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *PRAEGLOBOTRUNCANA*, *ROTALIPORA*, *GLOBOTRUNCANA* and *ABATHOMPHALUS* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)