

TERCIARIO (Plioceno Tardío)

Estado Carabobo

Referencia original: N. E. Weisbord, 1964-a, p. 30.

Weisbord (1962) describió gasterópodos provenientes de "La Salina de Guaiguaza" (correctamente Goaiguaza), en arcillas expuestas en una zanja y asignó la fauna provisionalmente al Plioceno. Posteriormente (1964-a), introdujo el nombre "Arcilla de Guaiguaza" para designar estas capas, que asignó al Plioceno Tardío; describió 14 especies de pelecípodos y dos de escafópodos (1964-b) y asignó a la fauna una edad algo más joven que la de las formaciones Playa Grande y Mare del Grupo Cabo Blanco. La fauna es significativa por ser la única atribuida definitivamente al Plioceno Tardío en Venezuela. La unidad tiene su localidad tipo en la salina de Goaiguaza en la costa del Mar Caribe, unos 6 kilómetros al oeste-noroeste de Puerto Cabello, estado Carabobo, y se compone de arcillas grises y marrones aparentemente horizontales, de espesor desconocido; los contactos no fueron observados. Weisbord describió 41 especies de moluscos en total, 51% de las cuales corresponden a especies vivientes, a base de cuyo porcentaje asignó la fauna al Plioceno Tardío.

Referencias

Weisbord, N. E., 1962. Late Cenozoic palecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672.

Weisbord, N. E., 1964-a. Late Cenozoic palecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 45(204): 564. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(5): 146.

Weisbord, N. E., 1964-b. Late Cenozoic scaphopods and serpulid polychaetes from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 47(214): 111-203. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(5): 146.

[Enviar Comentarios](#)[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)