

TERCIARIO (Eoceno Temprano a Eoceno Medio)

Estado Guárico

Referencia original: Vivas y Macsotay (en Aguasuelos Ingeniería, 1990)

Consideraciones históricas: Vivas y Macsotay (en Aguasuelos Ingeniería, 1990) proponen el término formal de Formación Guaiquera, nombre tomado del sitio de Guaiquera, ubicado entre La Puerta, al norte y la población de San Juan de Los Morros, al sur del estado Guárico.

Localidad tipo: Corresponde a un holoestratotipo compuesto por: 1.- Los afloramientos discontinuos que se observan a lo largo de la carretera entre el cuartel Zaraza, sitio de la Guaiquera (al norte) y el monumento a la bandera, (situado en la redoma, al inicio de la vía hacia los baños termales y la Penitenciaría), en San Juan de Los Morros (al sur) y 2.- Los afloramientos que se observan en el curso del río Guárico, al sur del sitio de La Puerta, que corresponden a la parte superior de la redefinida ex-sección tipo de la Formación Guárico de Peirson *et al.* (1966, p.185, fig. 1) y que suprayace a los afloramientos de la Formación Caramacate en esta misma localidad (tercer hipoestratotipo del ex - Miembro Caramacate de la Formación Guárico de Peirson *et al.*, *op. cit.*, p. 205).

Descripción litológica: Se estima un espesor máximo de 500 m para esta nueva unidad litoestratigráfica constituida de afloramientos discontinuos de alternancias monótonas y rítmicas de lutitas y areniscas. Las lutitas son gris verdoso, arenáceas y muy micáceas que meteorizan a pardo oscuro. Las areniscas son grauváquicas, parcialmente líticas, de espesores centimétricos a métricos, de color gris verdoso que meteoriza a pardo oscuro y pardo rojizo. Las estructuras sedimentarias observadas son la gradación normal, las laminaciones paralela y cruzada y en la base de algunas capas las estructuras o calcos de carga.

Dentro de la alternancia monótona y rítmica se destacan ocasionales niveles lenticulares de hasta 7 m de espesor conformados por diamictitas oligomícticas con predominio de clastos subredondeados a redondeados (tipo pudinga) y escasos clastos subangulares de volcanitas sin diferenciar y esquistos cuarzo-feldespático-micáceos. El diámetro máximo de los clastos es de 50 cm y los clastos flotan dentro de una matriz pelítico-psammítica muy meteorizada a pardo oscuro y pardo rojizo (Vivas en Aguasuelos Ingeniería, 1990 y Vivas y Macsotay, 1995-d).

Extensión geográfica: La Formación Guaiquera, solamente aflora en el valle entre los ríos San Juan y Guárico (sector La Guaiquera), inmediatamente al norte de la fila El Aventado-San Juan de Los Morros (fig. 1).

Contactos: En la región del valle de los ríos San Juan y Guárico, la Formación Guaiquera suprayace concordantemente a la Formación Caramacate. Al sur del río San Juan la formación se encuentra en contacto tectónico lateral con la unidad litodémica de Lavas y Tobas de Las Hermanas que afloran en la fila El Aventado. La sección originalmente propuesta por Mencher (LEV, 1956, p. 278) como sección tipo de la Formación Guárico, a lo largo del río del mismo nombre y posteriormente enmendada por Peirson *et al.*, 1966, p. 189, fig. 1) se compone de: Formación Caramacate + Formación Guaiquera, corridos con vergencia sureste (a través de la falla de Cantagallo), sobre la Formación Garrapata perteneciente a la Unidad Olistostrómica de Platillón de la Napa Piemontina (Vivas en Aguasuelos Ingeniería, 1990, fig. ZC-7; Macsotay, Vivas y Moticska, 1995, p. 115-123; Vivas y Macsotay, 1995-c y d y este trabajo, fig. 1).

Fósiles: No se encontraron fósiles en esta unidad.

Edad: En base a su posición estratigráfica relativa, al suprayacer en contacto concordante a la Formación Caramacate, se le asigna una edad Eoceno Temprano a Eoceno Medio.

Paleoambientes: Los suscritos (en Aguasuelos Ingeniería, 1990) postularon para ésta unidad, en base a sus estructuras sedimentarias un paleoambiente batial regresivo a plataforma externa. La presencia de conglomerados donde abundan los clastos bien redondeados, producto de meteorización subaérea de las volcanitas de la Napa de Villa de Cura, podrían sugerir que éstas se hallaban emergidas y formando islas para la época de sedimentación de la actual Formación Guaiquera.

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, 1990. "Modernización de los datos geológicos en el frente de montañas", preparado para CORPOVEN S. A., *Informe interno*, 5 tomos, 1023 pp. 126 lams. 53 fig.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Pub. Esp. N° 1, *Bol. Geol.*, 728 p.

Macsoy, O.; V. Vivas y P. Moticska, 1985. "Biostratigraphy of the Piemontine Nappe of north - central Venezuela: Senonian to Eocene gravitational sedimentation". *IX Cong. Latin. Geol., Caracas, Nov. 1995. Bol. Geol. Publ. Esp. N° 10(?)*, Agosto 1996: 114-123.

Peirson, A. L; A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. "The Guárico Formation of North - Central Venezuela". *Asoc. Ven. Geol.. Min. y Petr. Bol. Inf.*, 9(7): 183 -224.

Vivas, V. y O. Macsoy, 1995-c. "Formación Tememure: Unidad Olistostrómica Eoceno superior - Oligoceno inferior en el frente meridional de la Napa Piemontina, Venezuela Nor - Central". *IX Cong. Latin. Geol., Caracas, Nov. 1995. Bol. Geol. Publ. Esp. N° 10(?)*. Agosto, 1996: 95 -113.

Vivas, V. y O. Macsoy, 1995-d." Napa Piemontina: Unidades pre y sin-colisión de las placas Caribe y Suramericana. Cretácico (Senoniense) a Eoceno medio, Venezuela Nor - Central". *IX Congreso Latinoamericano de Geología*, Caracas. Excursión Geológica N° 7 (inédita).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)