


**TERCIARIO** (Mioceno Medio)

Estado Lara

Referencia original: J. R. Bushman, 1959, p. 74.

Consideraciones históricas: El nombre de Formación Guamacire fue publicado originalmente por Bushman (1959), para designar una secuencia de areniscas, lutitas, margas y calizas que aflora al sur de Barquisimeto, estado Lara. Jefferson (1964) descartó el uso de dicho término para los sedimentos que describió en la región Quibor-Sanare como Formación El Pegón. Bushman (1965) amplió la descripción de la unidad. Campos *et al.* (1979), la mencionan en la región Sanare-Cabudare. Odreman y Medina (1984) informan sobre el hallazgo de macro y microfósiles en la formación.

Localidad tipo: Quebrada Guamacire, 500 m al sur de su confluencia con el río Claro, a unos 6 km al sur de Barquisimeto, en el límite entre los distritos Iribarren y Palavecino, estado Lara. (Hoja 6346, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: En la localidad tipo, la formación se compone de areniscas de grano fino, de colores gris claro a gris amarillento claro, calizas limolíticas margas y lutitas arcillosas gris azulado claro. (Bushman, *op. cit.*). Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) opinan que la Formación Guamacire es suficientemente distinta litológicamente de la Formación El Pegón, que se justifica mantener ambos términos formalmente. Guamacire se compone de areniscas, calizas limosas, margas y lutitas, con frecuentes lentes de conglomerados e incluso, en las vías Quibor-Sanare-Cubiro, secuencias con 10 m de espesor de conglomerados con cantos de hasta 40 cm de diámetro.

Espesor: En la localidad tipo, Bushman (*op. cit.*) indica "al menos 100 m" de espesor. Campos *et al.* (*op. cit.*), coinciden con esta estimación en el área Sarare-Cabudare.

Extensión geográfica. Además de la localidad tipo, la Formación Guamacire aparece al norte y noreste de Yaritagua, entre las quebradas El Pegon y Las Animas. Generalmente ocurre en afloramientos de poca extensión, aunque es posible que haya tenido una distribución mayor en el pasado.

Contactos: En la localidad tipo y en el área al norte y noreste de Yaritagua, la formación yace discordantemente sobre las rocas metamórficas del Grupo Los Cristales, del Cretácico. El contacto superior es con aluviones cuaternarios.

Fósiles: Bushman (*op. cit.*), menciona moldes de gasterópodos, pelecípodos y algas (*Chara* sp.) además de ostrácodos entre los cuales Sellier De Civrieux (*vide* Bushman *op. cit.*) identificó *Cytherella* sp. *Gomphocythere* (?) sp. (o *Metacypris* (?) sp.) y *Clithrocytheridea* (?) sp. Odreman y Rivas (1984) informan del hallazgo de foraminíferos planctónicos, entre ellos *Globorotalia fohsi*, en sedimentos adheridos a los dientes de un cetáceo del orden *Odontoceti*, colectado por el Dr. J. Royo y Gómez en la quebrada El Abra, cerca de El Tocuyo y depositado en la Escuela de Geología de la Universidad Central de Venezuela. Los citados autores atribuyen esos sedimentos a la Formación Guamacire por sus características litológicas.

Edad: La fauna de ostrácodos indica posible edad miocena, por otra parte, el hallazgo de *Globorotalia fohsi* f., corroboraría la edad Mioceno Medio. Campos *et al.* (1979) y Stephan (1982) asignan los fósiles mencionados arriba al Mioceno Tardío o al Plioceno. Sin embargo, el foraminífero *G. fohsi fohsi* es fósil guía de la zona del mismo nombre, del Mioceno Medio, Sub zonas N-10 y N-11.

Correlación: La Formación Guamacire ha sido correlacionada con las formaciones Capadare, del norte del estado Lara, y El Pegón, del sureste del mismo estado. Según Kiser (1997 comentarios enviados al CIEN), con los datos publicados sobre las Formaciones Guamacire y El Pegón, es imposible determinar si pertenecen al mismo ambiente y al mismo ciclo sedimentario; por lo tanto, está en duda su equivalencia e, incluso, su validez. El suscrito recomienda que, hasta tanto no se aclaran las relaciones estratigráficas entre ambas "formaciones", se considera "válido" el nombre "Guamacire" por haber aparecido en Bushman (1959) antes que la descripción de su "Formación El Pegón", quedando así como "informal" el uso de este último nombre. Además de El Pegón, la Formación Guamacire ha sido correlacionada con la Formación Capadare, del norte del estado Lara.

Paleoambiente: La Formación Guamacire parece haberse depositado en un ambiente de laguna costera, con cierta influencia de sedimentación continental. El hallazgo de restos de cetáceos indicaría una conexión con el mar abierto. Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) consideran que la formación fue sedimentada en ambiente marino marginal a continental-piemontino y lacustre.

© *P. Jam L., 1997*

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)