

TERCIARIO (Mioceno - Plioceno)

Estado Sucre

Vivas y Goda (en Macsotay, 1987) designan con este nombre las capas lenticulares, de 2 a 10 m de espesor, de conglomerados gruesos de color rojo parduzco y blanco grisáceo expuestas a lo largo de la costa meridional del golfo de Cariaco y que, en la vecindad de Marigüitar, tienen una extensión de unos 12 km, Consisten de cantos y peñas de areniscas cuarcíticas, con matriz de arenisca arcillosa, los cuales alternan con capas lenticulares de arenas mal escogidas y arcillas ferruginosas. Esta secuencia presenta buena compactación, está fallada, fracturada y alcanza un espesor máximo de 200 m. La unidad yace con discordancia angular sobre la Formación Taguarumo (Guillaume *et al.*, 1972), la cual también presenta evidencias de tectonización intensa. Esta unidad informal se correlaciona con la Formación Caigüire (Vivas y Goda, *op. cit.*).

© **M. E. M. 3er Léxico****Referencias**

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 5(3): 1619-1655.

Macsotay, O., 1987. ????????????????????

[Enviar Comentarios](#)[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)