

TERCIARIO (Oligoceno tardío a Mioceno temprano)

Estado Sucre

Referencia original: Informe de Aguasuelos Ingeniería, dentro del proyecto "Levantamiento geológico de superficie de la Serranía del Interior, cuenca oriental de Venezuela" realizado para Lagoven S.A.

El reporte consta de diez (10) volúmenes, en el volumen II de estratigrafía, en la página 12, del sector noreste de la serranía del interior oriental, zona Guaruta, Cangrejal, Guacamaya, estado Sucre, se encuentra descrita esta nueva unidad.

Para la realización de este proyecto intervino un grupo de geólogos y especialistas venezolanos y franceses, a saber: Nelson Cortés, coordinador general del proyecto; Jean Francois Stephan, coordinador técnico del proyecto; Cristian Beck, coordinador de la estratigrafía y sedimentología; Alirio Bellizzia, asesor; Carlos Sanchez e Yves Chevalier, coordinadores por parte de Lagoven S.A.; Hubert Arnaud, especialista en rocas carbonáticas del Cretácico; Jean Pierre Ivaldi, especialista en termoluminiscencia; Luc Bulot, especialista en amonites; Annie Arnaud-Vanneau, especialista en foraminíferos béticos del Cretácico; Michael Dubar, especialista en Minerales pesados; Pierre Saint-Marc, especialista en foraminíferos plácticos; Barry Carr-Brown, especialista en foraminíferos plácticos y béticos; Carla Müller, especialista en nannoplancton calcáreo; Jean Chorowicz, especialista en sensores remotos; Oliver Macsotay, especialista en macrofósiles del Cretácico y Terciario; Oscar Odreman, paleontólogo de la Universidad de Los Andes; Max Furrer, especialista en foraminíferos; Marianto Castro Mora, especialista en nannoplancton calcáreo; los geólogos de campo Michel Chaplet, Jean Francois Sauvage y Victor Vivas Gómez.

Localidad tipo: Carretera Cangrejal-Guaruta, principio de la carretera Agua Fría Arriba-Campo Alegre, en el estado Sucre.

Descripción litológica: Comienza en sección con rocas hemipelágicas, pelíticas, algo calcáreas, con interestratificaciones de arcillas de color gris claro, muy plásticas y con capas delgadas de areniscas finas, blancas a rojas, muy bien escogidas y con un espesor no mayor de y metro.

Espesor: No se especifica en la referencia original.

Contactos: Suprayace a la Formación Río Chávez, el contacto con el Miembro Río Chávez 2, no se observa, no pudiéndose precisar si se trata de un hiatus o de un contacto tectónico.

Fósiles: Escasos foraminíferos plácticos representados por *Globigerina* spp.; foraminíferos béticos tales como *Cyclammina cancellata*, *Ammobaculites* sp., *Bolivina* spp., *Gravellina narivaensis*, *Haplophragmoides narivaensis*, *Haplophragmoides* aff. *narivaensis*, *Haplophragmoides* spp., *Textularia* cf. *earlandi*, *Textularia* sp., *Trochammina* spp., *Uvigerina* spp., *Virgulina* sp. Escasa nannoflora calcárea representada por *Coccolithus pelagicus*, *Cyclicargolithus floridanus*, *Cyclicargolithus abisectus*, *Dictyococcites dictyodus*, *Discoaster tani nodifer*, *Sphenolithus distentus*, *Sphenolithus ciperoensis*, *Sphenolithus moriformis*.

Edad: Oligoceno tardío a Mioceno temprano.

Paleoambientes: Se le asigna un ambiente batial no diferenciado.

© **M. Furrer y M. Castro M., 1997**

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, 1994. Levantamiento geológico de superficie de la Serranía del Interior, Cuenca Oriental de Venezuela. 10 volúmenes, *informe inédito*, Archivos de geología, Lagoven S.A.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)