


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: A. Espejo, 1974, p. 235.**Consideraciones históricas:** El término fue publicado originalmente por Espejo (1974) para designar un plutón granítico de forma irregular, localizado en el extremo occidental de la región El

Manteco-Guri, que intrusióna rocas de la “Formación Carichapo” (hoy Anfíbolita de Carichapo) y a la Formación Yuruari.

Localidad tipo: No se ha señalado sección tipo para la unidad. Toma su nombre del hato Guásimo, situado inmediatamente al sur del cerro Orotuima, ubicado en la hoja de la Cartografía Nacional N° 7638, municipio autónomo Piar del estado Bolívar.**Descripción litológica:** Granito porfídico rosado de grano medio a grueso con cristales bien desarrollados de feldespato. Generalmente es macizo; localmente contiene concentraciones ovoidales ricas en biotita. Contiene frecuentes xenolitos, particularmente en los bordes cerca del contacto con la roca caja. El granito es de textura hipidiomórfica granular a porfídica, con grandes cristales de microclino y microclino-perfita en una matriz cuarzo feldespática, y cantidades menores de biotita, clorita y epidoto. En el triángulo cuarzo- feldespato potásico-plagioclasa, las rocas se ubican dentro de la zona de cuarzomonzonita.**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Según Espejo (*op. cit.*), podría representar parte de intrusiones postectónicas relacionadas con diferenciación a profundidad, de una última removilización de las rocas del Escudo, que afectó principalmente la parte oriental de la Guayana Venezolana. Este evento anorogénico es designado por Espejo y Santamaría (1974) como Evento Plutónico El Manteco.**Contactos:** El granito intrusióna rocas de la Formación Yuruai y de la Anfíbolita de Carichapo, y contiene abundantes xenolitos que se identifican como procedentes de esas unidades. Las brechas y tobas de la Formación Yuruari exhiben marcada recrystalización y porfídoblastos de andalusita y cordierita en la aureola de contacto del granito, donde se alcanza la facies de las corneanas horbléndicas.**Extensión geográfica:** Aflora sobre un área de unos 50 km². en el extremo occidental de la región El Manteco-Guri cerca del río Caroni.**Edad:** Precámbrico. Se determinó una edad aproximada de 1.580 m.a. (Espejo y Santamaría, *op. cit.*) por K-Ar en una muestra procedente de la unidad.**Importancia económica:** Posiblemente constituya cierto alineamiento con zonas de baja gravedad que sirvieran como vehículo para enriquecimiento en minerales básicos (Espejo, *op. cit.*) en la secuencia volcano-sedimentaria que intrusióna.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

ReferenciasEspejo, A., 1974. Guía de la excursión N° 3, Upata-El Manteco. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 68-83.Espejo, A. y F. Santamaría, 1974. Significado de nuevas determinaciones de edades, potasio-argón en la Guayana venezolana, *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 424-430.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)