




CRETACICO (Turonense)

Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1179.

El nombre Miembro Guayacán fué aplicado por Notestein *et al.* (1944) en la Concesión Barco (Colombia) a las calizas muy

fosilíferas desarrolladas en el tope de la Formación Cogollo (Formación Capacho, Sutton, 1946) definida por los mismos autores. Posteriormente, algunos autores extendieron el Miembro Guayacán y los consideraron como parte superior de ambas formaciones, Capacho y Escandalosa. La sección tipo está situada en la quebrada Guayacán, sobre el Domo Meridional de Petrólea. La sección en el río Guarurús, 5 km al norte de Zea, estado Mérida, ofrece muy buenos afloramientos y puede servir como sección de referencia. El miembro se conoce en el distrito Colón (estado Zulia), los estados Táchira, Mérida, Trujillo meridional y Barinas noroccidental.

El Miembro Guayacán consiste en capas gruesas de calizas bioclásticas macizas, muy fosilíferas, de color gris, intercaladas con lutitas no calcáreas gris oscuro a negro, micáceas y cantidades menores de limolita arcillosa gris (González de Juana, *et al.*, 1980). Según Renz (1959) hacia el norte de Mérida, las capas individuales de caliza disminuyen en número y se hacen gradualmente más gruesas. Entre las Cruces y La Carbonera, a lo largo de la carretera de Ejido a la Azulita, dos capas con litología típica de Guayacán encierran una intercalación de caliza densa, gris oscuro, y concreciones con "litología La Luna". Más hacia el noreste, en los estados Trujillo y Lara, el Miembro Guayacán desaparece completamente y es reemplazado por la Formación La Luna, que es más pelágica. En el subsuelo de Barinas las calizas del Miembro Guayacán marcan el límite entre las formaciones Escandalosa y la Morita infrayacente y suprayacente.

En la sección de referencia de Venezuela, el Miembro Guayacán tiene un espesor de 60 metros; en Táchira, esto varía normalmente entre los 40 y 50 m. En el río Santo Domingo y en la quebrada Bellaca (estado Barinas) el espesor del Miembro Guayacán aumenta hasta alcanzar los 125 m a expensas de las lutitas de Seboruco, el cual prácticamente desaparece (Renz, *op. cit.*). Según González de Juana, *et al.*, (*op. cit.*) este miembro constituye en Barinas un horizonte guía en los perfiles de reflexión sísmica y registros de pozos, y se conoce informalmente como caliza "O" de la Formación Fortuna.

De acuerdo a Renz (*op. cit.*) los fósiles encontrados son lamelibranquios pequeños, los amonites son escasos y fueron observados en pocas localidades en los estados Mérida y Táchira. El hallazgo más importante de esos fósiles corresponde a la quebrada El Macho, cerca de La Carbonera (camino de Ejido-La Azulita). En Táchira se encontraron amonites en la Quebrada Zorca, al este de Independencia. Se determinaron amonites *coilopoceras* indicativos de una edad Turoniense superior.

El Miembro Guayacán pasa lateralmente a la parte superior del Miembro Chejendé de la Formación La Luna, desde Mérida hasta el norte de Trujillo. Se presume que un cambio similar de facies se verifica desde el distrito Colón hacia el norte en Perijá, donde el equivalente cronológico del Miembro Guayacán forma parte de la Formación La Luna.

Véase [CAPACHO, Formación](#) y [ESCANDALOSA, Formación](#).

© V. Savian, 1997

Referencias

González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55(10): 1165-1216.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, *Bol. Inform.*, 3(7): 209.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol Geol.*, *Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area - A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, *Bol. Inform.*, 2(4): 65-84.

Dalton, L. V., 1912. Venezuela. *The South American series. London*, 320 p.

Dalton, L. V., 1912. On the geology of Venezuela. *Geol. Mag. (London)*, 9(575): 203-210.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Forth Worth, Texas, 525 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd ed., Paleont. Res. Ithaca, N. Y., 890 p.

Rod, E., 1959. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Rod, E. and Maync, W, 1954. Revision of lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, *Bull.*, 38(2): 193-283.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook (3): 33 p.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der Karibische Gebirge. *Geogr. Abhandl. (Penck)*, 3(1): 238.

Smith, J. W., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo Districts, Venezuela, 3rd. *World Petrol. Cong., Pr.*, sec. I, (geology), p. 56-71.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, *Bol. Inform.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)