




TERCIARIO (Eoceno Tardío)

Estado Táchira

Referencia original: L. Kehrler, 1949, p. 151.

El género *Hannatoma*, en particular la especie *H. emendorferi*, es un elemento clave en la fauna de moluscos de la Formación Carbonera, de Venezuela suroccidental (estado Táchira) y regiones adyacentes de Colombia. La edad de esta fauna fue analizada en un Simposio (Durham *et al.*, 1949) y establecida como Eoceno Tardío en esta región. En sus contribuciones al Simposio, Kehrler utilizó el término de "zona de *Hannatoma*" y junto con otros autores, se refiere al "nivel" o "capas de *Hannatoma*" en sentido cronoestratigráfico; en el mismo Simposio, mencionó la presencia de la unidad en Zulia nororiental y en el río Boconó, en el límite entre los estados Portuguesa y Barinas.

Referencias

Symposium, por: Durham, J. W., A. N. Dusenbury, H. D. Hedberg; I. Kehrler; J. Marks; R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The age of the *Hannatoma* mollusk fauna in South America. *A Symposium. Journ Paleont.* 23(2): 1145-160.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces