


HUSITO, Miembro (Formación Pozón)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, P. 2195.

El término fue introducido por Suter (1947), como Miembro de Arcillas Margosas de Husito, para la unidad media de la Formación Pozón y descrita en detalle por Renz (1948).

En la localidad tipo, la unidad consiste de 536 m de arcillas margosas pardo-chocolate a gris-pardas, que meteorizan a pardo-amarillento, con numerosas intercalaciones de margas de foraminíferos, que se hacen más frecuentes hacia el tope de la unidad. En el tercio inferior, se presenta un horizonte de concreciones de marga consolidada blanca y amarilla. Se observan granos diseminados de glauconita. En El Mene de Acosta las margas son más abundantes y las arcillas son de color anaranjado a marrón chocolate. Unos 120-150 m por encima de la base aparece un persistente horizonte con equinoides (Renz, 1948).

Los contactos, tanto inferior con el Miembro Policarpio, como superior con el Miembro Huso de la misma formación, son concordantes.

El miembro es muy ricamente microfossilífero. Renz (1948) estudió sistemáticamente los foraminíferos y estableció la Zona de *Siphogenerina transversa* (parte superior) y las zonas de *Globorotalia fohsi*, de *Valvulineria herricki* y de *Marginulinopsis basispinosus*. Blow (1959) estudió igualmente los foraminíferos, con especial énfasis en los planctónicos y reconoció las zonas de *Globorotalia fohsi barisanensis* (= *G. fohsi peripheroronda*), de *G. fohsi fohsi*, de *G. fohsi lobata*, de *G. fohsi robusta* y de *Globorotalia mayeri*, definidas anteriormente en Trinidad, y estableció las zonas de *Globorotalia menardii menardii*/*Globigerina nepenthes* y de *Sphaeroidinella seminulina* (parte inferior). En términos modernos, el Miembro Husito es de edad Mioceno medio y Tardío, desde la Zona de *Globorotalia fohsi peripheroronda* hasta la de *Globorotalia acostaensis* (Díaz de Gamero, 1985b). Van den Bold (1966) estudió sistemáticamente los ostrácodos.

Según Renz (1948), el miembro se depositó en condiciones marinas, a una profundidad entre los 200 y 600 m de profundidad, bajo condiciones climáticas cálidas. Van den Bold (1966), en base a los ostrácodos, interpreta una profundidad marina de unos 100 a 170 m (300-500 pies) para la mayor parte del Miembro Husito, pasando a unos 30 a 70 m (100-200 pies) para la parte superior del miembro.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Van den Bold, W. A., 1966. Ostracoda of the Pozón section, Falcón, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 40(1): 177-185.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bandy, O. L., 1964. *Cenozoic Planktonic foraminiferal zonation*. Micropaleontology, 10(1): 1-17.

- Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.
- Bolli, H. M., 1957-a. The genera *Praeglobotruncana*, *Rotalipora*, *Globotruncana* and *Abathomphalus* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.
- Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.
- Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.
- Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.
- Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).
- Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.
- Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)