


HUSO, Miembro (Formación Pozón)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195.

El nombre de Miembro de Arcillas de Huso fue introducido por Suter (1947) para la unidad superior de la Formación Pozón, pero la descripción detallada es de Renz (1948).

En la localidad tipo, se compone de arcillas grises no calcáreas, que meteorizan a rojo, con intercalaciones de margas y arcillas margosas gris-pardas, que meteorizan a amarillo; los granos de glauconita son raros. Algunas de las capas de margas alcanzan un espesor de hasta 20 m. Hacia el tope de la unidad, se presentan lentes ocasionales de arena calcárea de grano fino, parda amarillenta. El espesor en la sección tipo es de 496 m. En la región de El Mene de Acosta, las arcillas son grises, las capas de margas son mas abundantes y las arenas están ausentes. El espesor, de 570 m, es incompleto, ya que el tope está cortado por depósitos aluviales.

El contacto inferior es concordante y transicional con el Miembro Husito de la misma formación y el superior es concordante con la Formación Ojo de Agua, colocándose en la base de la primera arenisca masiva de dicha formación. Este contacto es de carácter diacrónico, haciéndose progresivamente mas joven de oeste a este.

Renz (1948) estudia sistemáticamente los foraminíferos del miembro y establece la Zona de *Robulus senni* y las zónulas de *Vaginulinopsis superbis-Trochammina* cf. *pacifica*, de *Textularia panamensis* y de *Elphidium poeyanum-Reussella spinulosa*. Blow (1959) estudia igualmente los foraminíferos, con especial énfasis en los planctónicos, y establece la Zona de *Sphaeroidinella seminulina* (parte superior) y la Zona de *Globigerina bulloides*. En términos modernos, la edad del Miembro Huso es Mioceno Tardío (Díaz de Gamero, 1985b). Van den Bold (1966) estudia sistemáticamente los ostrácodos.

Según Renz (1948), la unidad se sedimentó en condiciones marinas poco profundas, inicialmente a unos 100 m de profundidad, que disminuyó a 50 m y, eventualmente, a condiciones muy someras, con influencias salobres, al tope. Van den Bold (1966), en base a los ostrácodos, interpreta un ambiente marino de profundidad inferior a los 30 m (100 pies) para la sedimentación de la unidad.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer. Mem.*, 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Van den Bold, W. A., 1966. Ostracoda of the Pozón section, Falcón, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 40(1): 177-185.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bandy, O. L., 1964. *Cenozoic Planktonic foraminiferal zonation*. Micropaleontology, 10(1): 1-17.

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *Praeglobotruncana*, *Rotalipora*, *Globotruncana* and *Abathomphalus* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)