




PALEOZOICO (Cámbrico)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1942, p. 200.

Consideraciones históricas: El término Formación Hato Viejo fue publicado originalmente por Hedberg (1942), siendo el autor del nombre M. W. Haas (1939, citado por Hedberg 1950). Feo-Codecido (L.E.V. I, 1956) resumió lo publicado sobre la unidad por Liddle (1946), Bucher (1952) y Feo-Codecido (1953-54).

Localidad tipo: Pozo Hato Viejo, de la Standard Oil Company, en el intervalo 835 m (2.740 pies) a 869 m (2.850 pies). El pozo está ubicado a unos 50 km al sur de Pariaguán, en el distrito Monagas del estado Anzoátegui (Hoja 7240, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La unidad es esencialmente una arenisca de grano fino a grueso, colores gris-rosado, gris y gris oscuro, friable, dura, maciza y áspera, ligeramente calcárea y en partes muy micácea y pirítica; los granos son redondeados y muy bien cementados. La arenisca contiene conglomerados y peñas de cuarcita a intervalos irregulares; localmente, se presentan vetas de calcita a lo largo de fracturas. Ciertas secciones de la arenisca muestran características cuarcíticas; otras son muy feldespáticas, verdes y glauconíticas (Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1970).

Hedberg (*op. cit.*) añadió que la formación consiste principalmente en areniscas arcósica-cuarcíticas, de grano mediano a grueso, con algunas láminas de argilita verde. En la parte inferior, el conjunto mineralógico se caracteriza por leucoxeno y circón, hacia arriba, pasa a uno con granate y biotita.

Espesor: El espesor máximo penetrado es de unos 91 m (300 pies). La formación desaparece al este de Anzoátegui meridional, donde el Grupo Temblador del Cretácico, es discordante sobre rocas precámbricas del escudo de Guayana, y parece ser relativamente delgada, en la mayoría de los pozos perforados en el estado Guárico.

Extensión geográfica: Subsuelo de la parte sur del estado Guárico, y suroccidental del estado Anzoátegui. Se desconoce en afloramientos.

Contactos: La formación infrayace a la Formación Carrizal del Paleozoico (Cámbrico Temprano), con la cual guarda estrecha relación, y suprayace discordantemente a las rocas precámbricas del escudo de Guayana. En pozos del área de Zuata, se encuentran intercalaciones arenosas dentro de la Formación Carrizal, que presentan las características de la Formación Hato Viejo. Podría considerarse, que en su parte más joven al menos, esta última formación equivale cronológicamente a la Formación Carrizal.

Fósiles: Hasta el presente, no hay mención de restos fósiles en esta formación.

Edad: La edad de esta formación ha sido modificada a Cámbrico temprano, de acuerdo al cambio en edad sufrido por la Formación Carrizal, suprayacente (De Giacomo, 1985; Sinanoglú, 1980).

Correlación: Esta formación representa la base del Paleozoico. Cronológicamente, es equivalente de la Formación Mireles del área de El Baúl (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN)

Paleoambientes: El ambiente de sedimentación es continental, y sus sedimentos representan el relleno de cuenca (facies fluvial y/o piedemonte) de una fase erosiva, contemporánea o subsiguiente a un período de intensa actividad tectónica.

© N. Escalona y P. Jam L., 1997

Referencias

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

De Di Giacomo, E., 1985. Acrítarcos de la Formación Carrizal, Área de Zuata-Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela Oriental. *VI Congreso Geológico Venezolano*, 1: 503-529.

Feo-Codecido, G., 1953-4. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 3(8): 109-121.

Hedberg, H. D., 1942. Mesozoic Stratigraphy of northern South American. *Eighth American Scientific Congress*, U.S.A., 1940, Proceeding 4: 195-227.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Sinanoglú, 1980. ???

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 58(8): 689-702.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Caracas, Foninves, 1031 pp.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes. *III Congreso Geológico Venezolano*, Caracas, 1959, Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Boletín de Geología, Publicación Especial N° 3, 4: 1.453-1.530.

Stover, L. E., 1967. Palynological dating of the Carrizal Formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(10): 288-302.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)