

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: Briceño, H., J. Tapia y J. Estanga, 1989, p. 58.

Consideraciones históricas: Briceño *et al.* (1989) publicaron originalmente este nombre para designar "una secuencia de rocas volcánicas y rocas sedimentarias que constituyen la base del Grupo Roraima y se hayan en discordancia angular sobre las volcánicas del Grupo Cuchivero," que afloran en las inmediaciones del Tepuy Ichún, estado Bolívar. Aunque su descripción es muy completa, se incluye como informal, hasta tener mayor información.

Localidad tipo: Aguas arriba del raudal Los Brasileños (río Paragua) hasta el Salto Espuma, en la región sur-central del estado Bolívar (Hoja N° ????, escala 1:100.000) Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Los autores deividen la unidad en tres miembros: uno inferior constituido por tobas, aglomerados y brechas volcánicas con menores proporciones de areniscas volcanoclásticas y flujos intermedios, con un espesor de aproximadamente 950 m, un miembro intermedio constituido por areniscas cuarzosas. flujos faseríticos, areniscas volcanoclásticas y feldespatícas, localmente conglomeráticas y tobas de cenizas, el cual alcanza unos 920 m de espesor y un miembro superior de aproximadamente 920 m de espesor en el cual las volcánicas felzicas son más abundantes y están intercaladas con tobas y areniscas volcanoclásticas.

Las rocas tobáceas no muestran evidencias de metamorfismo ni de deformación, muestran buena estratificación y tienen composición semejante a las de la Formación Caicara.

Espesor: La unidad alcanza un espesor total de aproximadamente 2500 m, distribuidos en los tres miembros ya descritos.

Extensión geográfica: Aflora extensamente alrededor de los Tepuis Ichún y Guanacoco y en un sector de los ríos Ichún y Paragua, en donde se establece la localidad tipo.

Contactos: La secuencia volcano-sedimentaria es discordante sobre las volcánicas de la Formación Caicara e infrayacen concordantemente a rocas típicas de la Formación Uairén del Grupo Roraima. Los autores consideran que vistas las relaciones de campo y las consideraciones geoquímicas, no quedan dudas de que estamos en presencia de una secuencia Pre-Uairén no descrita en la literatura. Proponen además que esta secuencia volcano-sedimentaria sea incluida como parte integrante del Grupo Roraima, como una nueva formación, que infrayace transicionalmente a la Formación Uarén.

Edad: De acuerdo a la posición estratigráfica de las rocas de la Formación, la edad se establece entre 1900 ± 200 m.a. que es la edad estimada de la Formación Caicara y 1350 - 1550 m.a. la cual se ha determinado para el Grupo Roraima.

Paleoambientes: De acuerdo a los aspectos geológicos, petrográficos y geoquímicos de las rocas de la Formación Ichún, los autores consideran que se originaron por erupciones violentas de lavas y material piroclástico a partir de un magma de composición intermedia, generado por fusión parcial de rocas corticales, seguidas por períodos de sedimentación fenial en llanuras de inundación o fango-costera.

Geoquímica: Las rocas de la secuencia volcano-sedimentarias muestran un empobrecimiento en los elementos Fe, Ca, Mg, P. y Mn en las rocas mas diferenciadas, por otra parte el Al presenta un ligero enriquecimiento en las rocas menos evolucionadas. El K, muestra fraccionamiento moderado con tendencia a enriquecerse en las rocas mas diferenciadas. Los elementos trazas Th, Hf, Zr, Rb, Y, La, Ce, e Yb, indican un buen grado de diferenciación. Sus patrones de distribución permiten postular aspectos importantes en cuanto a las relaciones comagmáticas y evolución magmática de la serie de rocas estudiadas.

Geofísica: La descripción litológica sugieren que las rocas deben ser altamente magnéticas, no se han hecho medidas directas.

Importancia económica: En el área existen numerosas concesiones mineras otorgadas para oro y diamante. Además los tipos litológicos son fuentes probables para cobre, plomo y zinc.

Referencias

Briceño, H., J. Tapia y J. Estanga, 1989. Formación Ichún, volcanismo ácido del Grupo Roraima. *VII Cong. Geol. Venezolano*. 1: 58-81.

U.S. Geological Survey, 1993. Geology and Mineral Resource Assessment of the Venezuelan Guayana Shield.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)