

TERCIARIO (Mioceno Medio)

Estado Monagas

Referencia original: Key, C., 1977.

Consideraciones históricas: El nombre de Miembro Jobo fue introducido y publicado originalmente por Key (1977), para designar el segundo intervalo, en orden descendente, de la Formación Oficina, en el sur de Monagas. El Membro Jobo, denominado incorrectamente Grupo I, con anterioridad, o Arenas 100 en el vecino campo de Morichal (Rabasco y Coronel, 1976), se compone de arenas color gris poco consolidadas, de grano fino a medio, las cuales son importantes productoras de petróleo pesado, lutitas macizas o laminadas y algunas capas de lignito. En la sección de referencia del pozo Voc-29 (3284 a 3518 pies, 1001 a 1072 m), el miembro tiene un espesor de 31 m. El Miembro Jobo yace concordantemente sobre el Membro Yabo, de la misma Formación Oficina. Hacia arriba, pasa transicionalmente al Miembro Pilón. Santos y Frontado (1987) extienden la unidad hasta el sector cerro Negro, faja petrolífera del Orinoco, al sur y suroeste del campo Jobo.

Véase [OFICINA, Formación](#).

© *P. Jam L., 1997*

Referencias

Key, C., 1977. La Formación Oficina en el campo Lobo. *V Cong. Geol. Venez.*, 4: 1599-1615.

Rabasco V., J. y G. Coronel, 1977. La geología del campo Morichal. *AVGMP*, Bol. Inf., Caracas, 19(2): 91-104.

Santos A. y L. Frontado, 1987. Reservoir geology of the Cerro Negro stream injection area, Orinococ oil belt, Venezuela, Scientific Press, Beaconsfield; *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 177-194.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)