

CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Mérida

Referencia original: Schubert y Valastro, 1973.

Consideraciones históricas: Ninguna.

Localidad tipo: A lo largo de la carretera Mérida-Valle Grande y en las riberas del río Mucujún, al norte del caserío de La Culata (Hoja 5942, escala 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: El till que forma las Morrenas de La Culata consiste de una mezcla marrón clara a gris claro de fragmentos, con tamaños que varían entre arcilla y cantos, sin escogimiento ni estratificación aparente (excepto en paqueños lentes de arcilla limosa). Los cantos y gujarros consisten de gnéis (30-50%; bandeado y granítico), rocas graníticas (29-51; granodiorita y adamelita), esquisto cuarzo-micáceo (14-16) y cantidades menores de pegmatita y cuarzo blanco (todas rocas típicas del basamento precámbrico y paleozoico; Kovisars, 1972). Los clastos varían entre prismoidales a tabulares, con facetas bien desarrolladas (aproximadamente el 1% muestra estrías) están ordenados formando una fábrica interna, la cual se ha interpretado como un reflejo del flujo de los glaciares (Schubert, 1979). Son mayormente subangulares a subredondeados. Este till se encuentra dentro de seis morrenas individuales entre 3000 y 3600 m, y en un afloramiento (probablemente de un till más antiguo) aproximadamente a 2600 m, llamado localmente Morrena Mucujún Media.

Espesor: Las Morrenas de La Culata alcanzan alturas de 150 a 200 m, lo cual refleja el espesor local aproximado del till.

Extensión geográfica: A lo largo del flanco sureste de la sierra de La Culata y el flanco noroeste del páramo El Escorial, valle del río Mucujún, al norte de Mérida (aproximadamente entre 2600 y 3600 m de elevación).

Contactos: El contacto inferior es discordante sobre las rocas del basamento (Formación Sierra Nevada, Granodiorita de El Carmen y Adamolita de La Culata), así como sobre sedimentos glaciales posiblemente más antiguos (till de fondo o lodoment till). Lateralmente, es discordante con rocas del basamento en las salidas de los valles glaciales.

Fósiles: No se han hallado fósiles en las Morrenas de La Culata.

Edad: Con base en dataciones radiocarbónicas de sedimentos orgánicos, depositados dentro de los arcos morrénicos, la edad mínima de las Morrenas de La Culata es holocena temprana; sin embargo, por la similitud morfológica y grado de meteorización, se puede afirmar tentativamente, que pertenecen al último estadio glacial pleistoceno (Glaciación Mérida; Schubert, 1974).

Correlación: Con base en la similitud morfológica, grado de meteorización y elevación, las Morrenas de La Culata probablemente son equivalentes al Till de Mucubají, así como a depósitos similares en otros valles andinos (Complejo Morrénico de Piedras Blancas, Morrenas de Batallón).

Paleoambientes: El till de las Morrenas de La Culata fue depositado en forma de morrenas laterales y terminales, durante el Pleistoceno Tardío (Glaciación Mérida). La distribución de las morrenas sugiere varios avances importantes de los glaciares. Durante la deposición, el clima de la región era periglacial. Posteriormente, durante el retroceso pleistoceno tardío-holoceno de los glaciares, los arcos morrénicos fueron el escenario de sedimentación aluvial y lacustre, así como de formación de turbas.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Ninguna.

© C. Schubert, 1997

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Kovisars, L., 1972. Geología de la parte norte-central de los andes venezolanos: *Bol. Geol.*, Pub. Esp. No. 5, 2: 817-860.

Schubert, C., 1974. Late Pleistocene Mérida Glaciation, Venezuelan Andes: *Boreas*, 3: 147-152.

Schubert, C., 1979. Glacial sediments in the Venezuelan Andes: en Schlüchter, C. (Ed.) *Moraines and varves*: Balkema, Rotterdam, p. 43-49.

Schubert, C. y S. Valastro, 1973. Páramo de La Culata, Estado Mérida: glaciación del Pleistoceno Tardío: *Bol. Inf. Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról.*, 16: 108-142.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)