


**PRECAMBICO TEMPRANO**

Estado Bolívar

Referencia original: N. Benaím, 1972, p. 1301.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido por Benaím (1972) para designar una secuencia de rocas predominantemente sedimentaria, de color rojo, generalmente bien estratificadas. Las características litológicas del conjunto son uniformes y se destacan muy bien, lo que hace fácilmente cartograficable esta unidad.

Localidad tipo: La sección tipo se estableció en un sector de 7 Km del curso del río Cuyuní, 4 Km aguas arriba y 3 Km aguas abajo de la desembocadura del río Botanamo, y en este río, desde su boca hasta un punto 2,2 Km aguas arriba, donde se presenta bien expuesta.

Descripción litológica: Metaconglomerados polimícticos, mal escogidos, lenticulares, de color verdoso a gris verdoso, ricos en fragmentos volcánicos ácidos e intermedios y escasos fragmentos de granito rosado muy fino, así como filitas cuarzo sericíticas, matareniscas de grano fino y metalimolitas, laminadas y finamente estratificadas, compuestas esencialmente por cuarzo, hematita, que les da el color rojo a la unidad, sericita y muscovita. Las rocas presentan estructuras sedimentarias primarias, como estratificación gradada, canales de erosión, estratificación ondulada y estratificación cruzada (en muy pequeña escala). Contiene además, metalavas y metabrechas ácidas e intermedias en su parte superior.

Espesor: Su espesor se estima aproximadamente en 4.000 m.

Extensión geográfica: Además de la sección tipo continua aflorando (Lira *et al.*, 1985), hacia el este, en el río Cuyuní, fuera del territorio venezolano (Frontera con la Zona en Reclamación) y en el curso inferior de los ríos afluentes de este río por su margen izquierda (ríos Marwani, Aguas Negras y Akarabisi), así como al norte del río Cuyuní, en el sector entre la Isla de Anacoco y el pueblo de San Martín de Turumbón.

Contactos: La unidad se interdigita con la Formación Caballape en el río Cuyuní en sentido del rumbo hacia el oeste y es concordante con dicha formación en el río Botanamo, donde ambas unidades afloran conformando un sinclinal abierto, cuyo eje tiene un rumbo este - oeste.

Edad: Precámbrico. Edad que se ha establecido para la Formación Caballape.

Correlación: Martín (1975) correlaciona la unidad con su Formación Maracapra.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Banaím, N., 1972. Geología de la región de Botanamo, estado Bolívar, IV Cong. Geol. Venez., Caracas, III: 1291-1314.

Lira, P.; J. Martínez; B. Rodríguez y C. Sosa, 1985. Reconocimiento Geológico de la Zona Botanamo - Akarabisi, Estado Bolívar. VI Cong Geol. Venez., III: 1758-1786. Sociedad Venezolana de Geólogos. Caracas.

Martín B., C., 1974. *Paleotectónica del escudo de Guayana*, Interguayanas, 9. Ciudad Guayana, Estado Bolívar, p. 251-305.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)