




CRETACICO (Cenomaniense)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. H. Hess y J. C. Maxwell, 1949, p. 1.858-60.

Consideraciones históricas: Este nombre es publicado por primera vez en esta obra, para designar la unidad pelítica superior del antiguo Grupo Los Robles el cual quedó restringido a esta sola unidad, al excluir del mismo a la Formación El Piache. Como integrante del grupo, la secuencia había sido denominada Formación El Cauca (González de Juana *et al.*, 1980), pero se prefiere el término Los Robles, por su mayor antigüedad y difusión.

Localidad tipo: La formación está expuesta en el extremo sur y sureste de la Isla de Margarita, en los cerros y colinas ubicados entre las poblaciones de Porlamar, Atamo y Los Robles, Hoja(s) 7448 (y 7449 ?), escala 1:100.000 (Cartografía Nacional).

Los mejores afloramientos se encuentran en la fila de El Cauca, al este de la carretera Porlamar-Guatamare.

Descripción litológica: González de Juana *et al.* (1980) distinguen dos secuencias dentro de la unidad. La secuencia inferior es pelítica, representada por filitas cuarzo-sericítico-cloríticas, que se van haciendo más calcáreas hacia el contacto con la Formación El Piache, infrayacente. La sección forma suelos de color verde-amarillento y pardo-rojizo, lo que la hace fácilmente distinguible de la secuencia samítica superior, que meteoriza en color gris blanquecino a gris amarillento. Esta última está representada por esquistos cuarzo-micáceo-cloríticos, con plagioclasa, epidoto y sericita, y en menor proporción, por cuarcitas micáceo-epidóticas y algunos metaconglomerados cuarzo-albíticos.

Espesor: Taylor (1960) estimó un espesor mínimo de 2.000 m para el antiguo Grupo Los Robles. Considerando que la potencia de la Formación El Piache es reducida, el espesor de la Formación Los Robles debe ser aproximadamente de ese orden.

Extensión geográfica: La unidad aflora también en el flanco occidental del cerro Matasiete, en el sector meridional de las Tetras de María Guevara y en la parte septentrional de la península de Macanao.

Contactos: La unidad sobreyace a la Formación El Piache en contacto transicional. En ausencia de esta unidad, se ha observado un contacto tectónico con el Grupo Juan Griego. González de Juana *et al.* (1980), indican que la parte superior de la formación, está cubierta por aluvión y sedimentos terciarios. Chevalier (1987) menciona un contacto tectónico con el Complejo Metaofílico de Paraguachí.

Fósiles: La fauna encontrada en esta formación, se limita a escasos ejemplares de *Hebergella* sp. provenientes de mármoles expuestos cerca de la Punta La Lavandera, en la Península de Macanao.

Edad: La edad determinada a esta formación, en base a su escasa fauna, es Cretáceo Medio, probablemente cenomaniense. Chevalier (1987) considera que la edad de esta secuencia puede extenderse hasta el Turoniense.

Correlación: La unidad se correlaciona con la Formación Laguna Chica de la península de Araya-Paria. Presenta también semejanzas litológicas con las formaciones Carúpano y Tunapui, de esa misma región.

Paleoambiente: Las rocas sedimentarias que dieron origen a esta secuencia, fueron depositadas en ambiente de plataforma en el paleo-margen continental de sudamérica (Chevalier, 1987).

© M. I. Muñoz, 1997

Referencias

Chevalier, I., 1987. Les zones interne de la chaîne Sud-Caraïbes sur le Transect Ile de Margarita-Peninsule d'Araya (Venezuela) Pub. UBO-CNRS- INFREMER-ORSTOM-BRGM. Brest, 1987.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hess, H. H., J. C. and Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 838-893.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I., 1936. Notas geológicas sobre Margarita y Coche, *Soc Venez. Cienc. Nat.*, Bol., 3(28): 397-403.

Dauxion de Lavaysse, J. J., 1813. *Voyage aux Iles de Trinidad, de Tobago, de la Marguerite et en Vénézuéla*, 2 vols.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Sic. Am.*, Bull., 68(8): 689-702.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Guía, 30 p.

Hedberg, H. D., 1942. Mesozoic stratigraphy of northern South America, *8th. Am. Sei. Cong., Pr.*, 4: 195-227.

Jam, L. P. y M. Mendez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc Venez. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Maxwell, J. C. y Dengo, G., 1950. Geología del área de Carúpano, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol., 2(1): 149-162.

Richards, H. G., 1943. Pleistocene mollusks from Margarita island, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 17(1): 120-123.

Rutten, L., 1940. On the geology of Margarita, Cubagua and Coche (Venezuela), *Konin. Akod. van Wetenschappen te Amsterdam, Pr.*, 43: 828-841 (1-16 en separata).

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, *Globus*, 74: 163-165, 291-294, 302-306.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 64(1): 41-64.

Wall, C. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

