


**CARBONIFERO-JURASICO**

Estado Zulia

Referencia original: J. P. Hea y A. B. Whitman, 1960, p. 362.

Este nombre fue introducido por Hea y Whitman (1960) para agrupar las formaciones Tinacoa, Macoíta y La Quinta, "las cuales forman una asociación litológica de carácter provincial, caracterizada por contener abundantes productos volcánicos en sus sedimentos". No designaron localidad tipo, señalando sólo que los mejores afloramientos se encuentran en la Quebrada La Gé, Distrito Perijá del Estado Zulia; la unidad ocupa la región entre los ríos Palmar y Negro, Estado Zulia. Las formaciones componentes del grupo exhiben afinidades petrográficas, principalmente en lo que respecta a sus componentes volcánicos, tipos de feldespato y minerales accesorios. El espesor total mínimo del grupo es de 5.050 metros. Los contactos entre las tres formaciones que lo componen son transicionales. Se desconoce su base (base de la Formación Tinacoa) en la Sierra de Perijá; el contacto superior (tope de la Formación La Quinta) inírayace al Conglomerado de Seco, o a la Formación Río Negro, con un contacto generalmente discordante, pero posiblemente e transicional en algunas localidades. El grupo carece de fósiles marinos; sólo se observan restos paleobotánicos. Se le asigna una edad que abarca desde el Carbonífero (Pennsylvaniano) hasta el Jurásico. Los autores del nombre postulan la correlación parcial de la parte inferior del grupo con la parte inferior de la Formación Palmarito. La Formación La Quinta es equivalente de la Formación Girón en Colombia.

Véase [LA QUINTA, Formación](#); [MACOITA, Formación](#); [TINACOA, Formación](#).**Referencias**

Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y Petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *Cong. Geol. Venez. III*, Caracas, 1959. Mem. 1: 351-376.

[Enviar Comentarios](#)**Comentarios
Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)