




**CRETACICO** (Albiense - Cenomaniense)

Estado Táchira

**Referencia original:** O. Renz, 1959, p. 15-16.

Renz (1959) reconoció y designó este nombre a la parte inferior de la Formación Capacho con el nombre La Grita.

El Miembro La Grita tiene su localidad tipo en el río La Grita entre La Quinta y Seboruco, estado Táchira. La litología está constituida por calizas biomicríticas negras y densas alternando con calizas arcillosas finamente laminadas y concreciones calcáreas, siendo muy similar a la de la Formación La Luna. En Trujillo meridional y Barinas no se encuentran concreciones en el miembro, el cual consiste en caliza laminada de color gris oscuro con superficies onduladas, (Renz, *op. cit.*).

El espesor varía entre 5 y 10 metros en Táchira y Mérida y aumenta hacia Barinas a unos 50 m. Según Renz (*op. cit.*) el contacto del miembro con la Formación Maraca, infrayacente, está bien definido, su contacto superior con el miembro de lutita Seboruco es transicional en Táchira y Mérida.

Renz (*op. cit.*) señala que en la sección tipo, y en los pozos de Río de Oro, el Miembro La Grita contiene foraminíferos planctónicos, entre los cuales se destacan tipos primitivos de *Rotalipora* Brotzen (*Ticinella* Reichel y *Thalmaninella* Sigal). También se encuentran *Inoceramus* y abundantes restos de peces. Estos fósiles sugieren una edad Albiense Tardío a Cenomaniense Temprano (González de Juana, *et al.*, 1980).

En Tachira meridional parece que el Miembro La Grita pasa transicionalmente a lutitas, las cuales forman la parte basal de la Formación Escandalosa. Hacia el noreste (Trujillo y Lara) el miembro pasa transicionalmente a la parte inferior del miembro La Aguada de la Formación La Luna, (Renz, *op. cit.*).

Véanse [CAPACHO, Formación](#); [SEBORUCO, Miembro](#); [GUAYACAN, Miembro](#).

© V. Savian, 1997

### Referencias

González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209 p.

### Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area - A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Dalton, L. V., 1912-a. Venezuela. *The South American series*. London, 320 p.

Dalton, L. V., 1912-b. On the geology of Venezuela. *Geol. Mag.* (London), 9(575): 203-210.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mc.Gowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 55(10): 1165-1216.

Rod, E., 1959-a. West end of Serranía de Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 43(4): 772-789.

Rod, E., 1959-b. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Salvador, A., 1961-b. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook N° 3, 33 p.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der Karibische Gebirge. *Geogr. Abhandl. (Penck)*, 3(1): 238 p.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893. *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Enviar comentarios



**2a Edición LEV**



**Comentarios Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)