




TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: Taylor G. C., 1960.

Consideraciones históricas: Taylor (1960) publicó este término (mal escrito La Gúica), para designar una secuencia limo-arcillosa, generalmente calcárea, poco consolidada, expuesta en el caserio La Guica (abandonada actualmente), en la parte sur de Margarita oriental (Paraguaychoa); la atribuyó al Mioceno en la columna geológica, y al Oligoceno? en el mapa geológico. Bermúdez (1966), introdujo la nomenclatura correcta. Hunter (1977-a) le asigna rango de miembro medio dentro de la Formación Cubagua, reportando una microfauna característica de la Zona de *Neogrobogadrina dutertri*, de la parte superior del Mioceno superior. Aunque los contactos no se observen, por su paleontología, se le supone como una unidad con relaciones de campo normales con los otros miembros de la Formación Cubagua: las Calizas de Cubagua, infrayacentes, y el Miembro Las Hernández, suprayacente (Hunter, 1978-a).

Véase [CUBAGUA, Formación](#), [LAS HERNANDEZ, Miembro](#), [LA TEJITA, Miembro](#).

© O. Macsotay, 1997

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera Parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Hunter, V. F., 1977-a. ??????????????????????

Hunter, V. F., 1978. Notes on the Tertiary Stratigraphy of Margarita Island". *Geologie en Mijnbouw*. 57: 189-192.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959. 2: 838-893.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)