

MESOZOICO (Triásico - Jurásico)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1972.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido originalmente por González de Juana, *et al.* (1972) para designar un horizonte de calizas dolomíticas estratigráficamente en la parte media de la Formación Macuro, descrita en el curso medio del río La Horqueta y en otros ríos y quebradas paralelas. Este horizonte calcáreo tiene gran importancia ya que es una capa guía por una distancia de unos 12 km, desde la fila Parasol, al sur de la ensenada Cuchara hasta las cercanías de la quebrada El Mango, interrumpida en este sitio debido a procesos de asimilación durante la intrusión granítica de El Mango-Doña Juana. La caliza dolomítica es de color gris, a crema por meteorización, dura y densa, a veces homogéneas y a veces laminada, bien recristalizada y en algunos casos los cristales muestran orientación abundantes vetas de calcita blanca de origen posterior; los análisis de las calizas dieron la siguiente composición química CaCO_3 : 68,32 %; MgCO_3 , 23,54%; SiO_2 , 2,37%; R_2O_3 , 4,95%. Presenta un espesor de unos 50 m. No se hallaron fósiles, por su posición en la Formación Macuro se le asignó una edad Triásico - Jurásico.

Véase [MACURO, Formación](#).

© M. E. M. 3er Léxico

Referencias

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1972. Reconocimiento geológico de la Península de Paria, Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. 5, 3: 1549-1588.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)