


**PRE-MESOZOICO (?)**

Estado Cojedes

Referencia original: A. Menéndez, 1965, p. 427.

Consideraciones históricas: Menéndez (1965) empleó este nombre para designar una intercalación de gneises hornabléndicos, gneises biotíticos, anfibolitas y rocas cuarzo-plagioclásicas, que constituye la parte más antigua del Complejo de El Tinaco. Seiders (1965) correlacionó con esta unidad a rocas semejantes expuestas en Miranda central, 200 kilómetros al este de El Tinaco, y afirmó que la "diorita hornabléndica" y el "granito sódico" descritos por Smith (1953) son también posibles equivalentes, con lo cual confirmó deducciones previas de Mackenzie en su Tesis Doctoral (1953), publicada muy posteriormente (1966).

Localidad tipo: Quebrada Aragüita, Estado Cojedes.

Extensión geográfica: Los afloramientos de la unidad son esporádicos, desde la región de El Tinaco hacia el este hasta Miranda central; aflora más extensamente en los alrededores de El Tinaco y Tinaquillo, Estado Cojedes.

Descripción litológica: La unidad es una alternancia de capas máficas y félsicas de 5 a 30 centímetros de espesor promedio, que alcanza raras veces hasta 1 metro; esta alternancia, de colores contrastantes, produce el aspecto bandeado del gneis. Las capas félsicas (rocas cuarzo-plagioclásicas) suelen ser más delgadas que las máficas, (gneis hornabléndico-cuarzo-oligoclásico y anfibolitas). Entre ambos tipos hay transiciones, particularmente entre los gneises hornabléndicos y los biotíticos, que pasan de uno a otro en una misma capa. Los primeros abundan más que los segundos y éstos a su vez más que las anfibolitas.

En su parte superior, la unidad contiene capas de esquistos cuarzo-plagioclásicocloríticos y conglomerados esquistosos con cantos de cuarzo y rocas graníticas. Varias capas delgadas y lenticulares de mármol, de 0.5 a 3 metros de espesor, se intercalan con los gneises (menos del 2% de la unidad).

El gneis de La Aguadita aparentemente representa una secuencia sedimentaria con cantidades menores de adiciones volcánicas; las capas máficas se derivaron posiblemente de una secuencia lutítico-grauváquica, las félsicas de ftanitas impuras, y las anfibolitas de tobas básicas. Las condiciones fisicoquímicas predominantes durante el metamorfismo de la unidad corresponden a las de los grados inferiores de la facies de la anfibolita almandínica.

Contactos: Se desconoce su base; en su tope la unidad es concordante y transicional con el Esquisto de Tinapú suprayacente. Localmente el Gneis de La Aguadita infrayace a las formaciones Cojedes, Querecual, Las Placitas, Pílancones y a las "rocas de Conoropa".

Edad: Pre-Mesozoico (?).

Correlación: La unidad es correlativa probable del gneis de Sebastopol.

Referencias

Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 64(1): 41-64.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)