

PRECAMBRICO TARDIO

Estado Mérida

Referencia original: C. Schubert, 1968, p. 190.

Consideraciones históricas: El nombre de Gneis Bandeado de La Mitisus fue propuesto por Schubert (1968), para designar a una de las tres unidades de aplicación local, en las que dividió al Grupo Iglesias, en la región de Barinitas-Santo Domingo. Previamente, Oppenheim (1937) designó informalmente a los gneisses que afloran en el Alto Río Santo Domingo, como Gneis de Santo Domingo.

Localidad tipo: Carretera Barinitas-Santo Domingo, al este del caserío de La Mitisus (Hoja 6042, 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La unidad consiste de gneises y esquistos de biotita-muscovita-cuarzo, gneises y esquistos de biotita-almándina, gneises y esquistos de silimanita-almándina-biotita, gneises y esquistos de hornblenda-plagiocasa-biotita, anfíbolita, y diques de permagtitita y aplita. estas rocas forman un amplio sinforme con plegamientos menores isoclinales, los cuales determinan una alternancia de bandas de los diferentes tipos litológicos, cuyo espesor varía entre 0,5 y varios m.

Espesor: Debido al plegamiento, es difícil medir el espesor, pero en la región de Barinitas-Santo Domingo, esta unidad tiene un espesor aparente de por lo menos un km.

Extensión geográfica: La unidad se extiende en una ancha franja con dirección noreste, entre el río Santo Domingo y el páramo de Llano Corredor-Pico Güirigay. Ramírez *et al.* (1972) reconocen el equivalente litológico de esta unidad, hasta Jajó y Tuñame (estado Trujillo).

Expresión topográfica: Junto con las otras unidades en que se dividió al Grupo Iglesias, en la región de Barinitas-Santo Domingo (Esquistos y Cuarcitas de El Alambique y el Gneis Granítico de La Raya), forma el núcleo de la sierra de Santo Domingo y su extensión al noreste, hacia el páramo de Calderas.

Contactos: El único contacto que aflora, es aquel entre el Gneis Bandeado de la Mitisus y el Gneis Granítico de La Raya, el cual aparece como estructuralmente concordante. Hay indicios de migmatización del gneis bandeado cerca del contacto, lo cual sugiere que el Gneis Granítico de La Raya es intrusivo en el primero.

Fósiles: Ninguno.

Edad: Con base en las relaciones estratigráficas y correlaciones litológicas con otras regiones, se asignó una edad Precámbrico Superior a esta unidad.

Correlación: Con base en la litología y su continuidad en regiones hacia el sur, el Gneis Bandeado de la Mitisus es probablemente equivalente a la Formación Sierra Nevada, el Grupo Iglesias.

Paleoambientes: Según Schubert (1968), las rocas del Gneis Bandeado de la Mitisus fueron originalmente acumulaciones pelíticas y cuarzo-feldespáticas, las cuales fueron metamorfizadas regionalmente a la subfacie de silimanita-almándina de la facies de la anfíbolita. El límite superior podría haber llegado a los 700° C. y altas presiones de agua.

Importancia económica: Ninguna.

Sononimia: Ninguna.

© C. Schubert, 1997

Referencias

Oppenheim, V., 1937-a. Contribución a la geología de los Andes Venezolanos, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 23-45.

Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-43.

Ramírez, C., J. García y V. Campos, 1972. Geología de la región de Timotes, Estado Mérida, Barinas y Trujillo, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 5, 2: 898-934.

Schubert, C., 1968. Geología de la Región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, 5, 9(19): 181-261.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bass, M. N. y R. Shagam, 1960. Edades Rb-Sr de las Rocas Cristalinas de los andes merideños, Venezuela, Mem., *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 377-381.

Compañía Shell de Venezuela and Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic Rocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol., Bull.*, 48(1): 70-84.

Christ, P., 1927. La Coupe Geologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les andes Venezueliennes, *Eclog. Helv*, 20(3): 397-414.

Hea, J. P. y Whitman, A. B., 1960. Estratigrafía y petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 1: 351-376.

Kündig, E., 1938-a. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43

Kündig, E., 1938-b. The Precretaceous Rocks of the central Venezuelan andes with some remarks about the tectonics, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 21-43. (Ed. en Inglés).

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotrópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 1, 728 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo, Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)