

MIOCENO TARDIO A PLIOCENO TEMPRANO?

Informe de Aguasuelos Ingeniería, dentro del proyecto Levantamiento geológico de superficie de la Serranía del Interior, cuenca oriental de Venezuela" realizado para Lagoven S.A.

El reporte consta de diez (10) volúmenes, en el volumen II de estratigrafía, en el capítulo denominado Sector noreste de la Serranía del Interior oriental, zona Guaruta, Cangrejal, Guacamaya, estado Sucre, aparece en la página 12 la referencia original de esta unidad.

Para la realización de este proyecto intervino un grupo de geólogos y especialistas venezolanos y franceses, a saber: Nelson Cortés, coordinador general del proyecto; Jean Francois Stephan, coordinador técnico del proyecto; Cristian Beck, coordinador de la estratigrafía y sedimentología; Alirio Bellizzia, asesor; Carlos Sanchez e Yves Chevalier, coordinadores por parte de Lagoven S.A.; Hubert Arnaud, especialista en rocas carbonáticas del Cretácico; Jean Pierre Ivaldi, especialista en termoluminiscencia; Luc Bulot, especialista en amonites; Annie Arnaud-Vanneau, especialista en foraminíferos béticos del Cretácico; Michael Dubar, especialista en Minerales pesados; Pierre Saint-Marc, especialista en foraminíferos plácticos; Barry Carr-Brown, especialista en foraminíferos plácticos y béticos; Carla Müller, especialista en nannoplancton calcáreo; Jean Chorowicz, especialista en sensores remotos; Oliver Macsotay, especialista en macrofósiles del Cretácico y Terciario; Oscar Odreman, paleontólogo de la Universidad de Los Andes; Max Furrer, especialista en foraminíferos; Mariano Castro Mora, especialista en nannoplancton calcáreo; los geólogos de campo Michel Chaplet, Jean Francois Sauvage y Victor Vivas Gómez.

Aflora justo al frente del alóctono de la napa de El Pato, en el sector conocido como La Palmita, entre Agua Fría Arriba al oeste y la quebrada de Marcos, al este.

Lutitas limosas, silíceas, de color gris verdoso, lustrosas, que meteorizan a marrón claro y marrón rojizo. Son micáceas, contienen nódulos de forma esferoidal y elipsoidal, de arcillita o limolita gris verdoso y ferruginosa, muy meteorizada a marrón terracota y marrón rojizo. Areniscas clasificadas como sublitaremitas, delgadas, muy lenticulares, de grano anguloso, constituidas esencialmente por cuarzo detrítico y una menor proporción de fragmentos líticos de cherts y limolitas cuarzo-pelíticas, escasa plagioclasa y mica detrítica (muscovita) y muy escasa glauconita y circón. Tiene pelitas micro y nannofosilíferas que brindan edades contradictorias.

A lo largo de la carretera La Palmita-quebrada de Marcos se midió un espesor de 30 metros constituido por 86% de lutitas y 14% de areniscas.

Se interpreta que suprayace en discontinuidad estratigráfica, hiato o discordancia angular, a las hemipelagitas silíceo-calcáreas y arenosas pertenecientes a la Formación Río Chávez.

Las pelitas son micro y nannofosilíferas y presentan edades contradictorias, como Cretácico temprano, Cretácico tardío, y Eoceno medio tardío. Si se acepta que no hubo contaminación con pelitas ricas en nannoplancton calcáreo de edad Eoceno medio terminal, NP17 de Martini, 1971, se sugiere la misma edad o mas joven, para esta secuencia tectono-sedimentaria; o bien se trata de una mezcla o melange de hemipelagitas silíceo-calcáreas y arenosas, originado como producto del avance o desplazamiento tangencial de las napas El Pato y El Zorro, hacia el sur-sureste. La icnofauna está representada por *Chondrites* icnosp.; los foraminíferos béticos por *Ammodiscus cretaceus*, *Arenobulimina dorbignyi*, *Bathysiphon discreta*, *Bulimina* sp., *Glomospira gordialis*, *Glomospira charoides*, *Haplophragmoides linki*, *Hiperammina subdiscreta*, *Plectocurvoides rotundus*, *Praecystammina globigerinaeformis*, *Rzehakina epigona*, *Sacamina sphaerica*, *Trochammina pseudovesicularis*. Se presenta una mezcla en la nannoflora calcárea, encontrándose individuos del Cretácico tal es el caso de *Watznaueria barnesae* así como individuos del Eoceno como *Cyclococcolithus formosus*, *Cribrocentrum reticulatum*, *Dictyococcites dictyodus*, *Discoaster saipanensis*, *Discoaster tani nodifer*, *Discoaster barbadiensis*, *Helicosphaera compacta*, *Reticulofenestra umbilica*, *Sphenolithus moriformis*.

Se postula para el Melange de La Palmita una edad Mioceno tardío a Plioceno temprano?, sin mayor precisión, ya que correspondería al desplazamiento o corrimiento hacia el sur-sureste del alóctono de la Napa de El Pato, último evento compresivo mayor registrado en el borde meridional de la falla de El Pilar, Stephan *et al.* 1994.

Batial medio a inferior con paleoprofundidad entre 500 y 2000 metros.

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, 1994. Levantamiento geológico de superficie de la Serranía del Interior, Cuenca Oriental de Venezuela. 10 volúmenes, *informe inédito*, Archivos de geología, Lagoven S.A.

Martini, E., 1971. *Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation*. Proceedings of the II Planktonic Conference, Roma, 1970. A. Farinacci de., Edizioni Tecnoscienza, Roma, 1971, 1880 p.

Stephan, J. F.; C. Beck; V. Vivas; H. Arnaud; J. Chorowicz; O. Macsotay; M. Lujan; A. Pérez D' Gregorio & A. Sequera, 1994. Geometría e historia tectono sedimentaria del frente de montañas Caribe de Venezuela, desde Lara hasta el norte de Monagas. *V Simposio Bolivariano*, Puerto La Cruz, Venezuela. Memoria, p. 265.

Stephan, J. F.; C. Beck; M. Chaplet; J. F. Sauvage; V. Vivas; A. Bellizzia; P. Saint-Marc; L. Bulot; H. Arnaud; A. Arnaud-Vanneau; J. P. Ivaldi; J. Chorowicz; C. Muller; J. P. Masse; A. Latzoura; M. Dubar & O. Macsotay, 1994. Historia sedimentaria de la parte oriental de la Serranía del Interior Oriental (Venezuela). *V Simposio Bolivariano*, Puerto La Cruz, Venezuela. Memoria, p. 267.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)