

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: C. Martín, 1968, p. 356.

Consideraciones históricas: El término fue introducido por Martín (1968) para referirse a un cuerpo granítico que se encuentra a unos 4 km al noroeste del pueblo de La Paragua, estado Bolívar. Martín *et al.* (1975) señalan que esta roca es única en la región y que desarrolla bordes granofíricos y facies porfídica con textura rapakivi incipiente. Se aprecia una determinada zonación en los fenocristales de pertita potásica con proporciones variables de microclino-oligoclasa. Se observan las siguientes relaciones: fenocristales de pertita ligeramente reemplazada por oligoclasa y oligoclasa poiquilítica como núcleo rodeada de microclino; la matriz cuarzo-pertítica generalmente está cizallada.

Los ferromagnesianos son hornblenda marrón, ferrohastingsita y biotita férrica, estilpnomelano y biotita. Como accesorios se presentan fluorita, titanita y óxidos ferrosos. Estos minerales se presentan en agregados glomerulo-porfídicos que le imparten al granito un aspecto moteado azul-verdoso. Los parámetros químicos y el modo permiten clasificar la roca como granito alcalino. En una muestra tomada unos 4 Km al Noroeste del pueblo de La Paragua, se determinó una edad radiométrica en base a biotita de 1.300 ± 70 m.a., (Martín Bellizzia *et al.*, *op. cit.*). La intensa cataclasis que se observa en la matriz pone de relieve el episodio final de su emplazamiento durante el Tectonismo Orinoquense que produjo fuerte cizallamiento provocando escape isotópico y enmascarando la edad probable de su emplazamiento inicial (1.750 - 1.650 m.a.) a 1.250 m.a.

La unidad intrusiva a unidades posiblemente equivalentes a la Formación Caicara (Martín *et al.*, 1975) con desarrollo de cornubianita; en estas zonas se observan diques aplíticos y microgranitos cizallados. En la posición central del cuerpo o techo de la intrusión, se han observado xenolitos de volcánicas y metareniscas de dichas formaciones, embebidos en la masa del cuerpo. La unidad se considera equivalente probable del Granito de Parguaza.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Martín, C.; A. Espejo; J. H. Ríos; A. Menéndez y C. Petzall, 1975. Análisis crítico preliminar sobre algunas unidades estratigráficas del escudo de Guayana. *I Jorn. Venez. Geol., Min. y Pet.*, Maracaibo, estado Zulia. 15.

[Enviar Comentarios](#)[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)