

TERCIARIO (Mioceno)

Estado Falcón

Liddle (1928, 1946) se refirió a las "areniscas de La Planchada" y a la "arena petrolífera de La Planchada" en la parte suroeste del distrito Buchivacoa de estado Falcón, para designar sedimentos incluidos hoy en la Formación Agua Clara.

Véase [AGUA CLARA, Formación.](#)

Referencias

Liddle, R A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Liddle, R A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologiocal formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Halse, G. W., 1937. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 183-193.

Hoffmeister, W. S., 1938-a. Aspecto y división en zonas de la fauna de moluscos en las formaciones La Rosa y Lagunillas, campos costaneros de Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-122.

Hoffmeister, W. S., 1938-b. Aspect and zonation of the molluscan fauna in the La Rosa and Lagunillas formations, Bolívar coastal fields, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 103-122.

Koch, R., 1926. *Miogypsina staufferi*, nov. spec., from northwestern Venezuela, *Eclog. Geol. Helv.*, 19(3): 761-753.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiaren Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Williston, S. H. y C. R. Nichols, 1928. The geology of Venezuela and Trinidad, by R. A. Liddle, Review, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 12(4): 445-451.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)