

PRECAMBRICO

Estado Amazonas

Referencia original: Mendoza, V.; L. Moreno; F. Barrios; D. Rivas; J. Martínez; P. Lira; G. Sardi y S. Ghosh, 1977.

Consideraciones históricas: Mendoza *et al.* (1977) proponen este término para designar a una roca de composición granítica, con textura de augen gneis que aflora en los ríos Ventuari, Marueta, Guainía y Atabapo, estado Amazonas.

Localidad tipo: En la Punta Macabana, en el río Ventuari (próximo a la boca del río Marueta), en la parte centro-occidental del estado Amazonas (Hoja ????, esc. 1:100000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La unidad esta constituida por rocas de composición granítica con textura de augen gneis muy bien desarrollada y muy gruesa (augens con longitud mayor de 5 cms); muestran foliación acentuada y tiene un patrón semejante al del Complejo de Imataca (N50-70E). En el área de Las Isletas (río Guainía) los gneises contienen grandes intercalaciones o xenolitos de migmatitas de composición intermedia del tipo Complejo Guainiense (Issler, 1975). Petrográficamente las rocas muestran texturas hipidioblásticas bandeadas, con desarrollo de augens de gran tamaño. Muestran abundante microclino-peritita (30-35%), cuarzo cataclástico (20-25%), plagioclasa poco maclada (15-25%), contienen además biotita (marrón), hornblenda (verde intenso a marrón) y epidoto. Son comunes apatito, esfena, zircón y opacos. La coloración de las hornblendas y la sociación mineral sugieren un metamorfismo al nivel de la facies epidoto-anfibolita.

Extensión geográfica: Aflora en la región centro-occidental del estado Amazonas, en la Punta Macabana, en el río Ventuari cerca de la desembocadura del río Marueta, en el río Guainía (Sector Las Isletas) y en el río Atabapo.

Contactos: No se observan en el campo relaciones estratigráficas de estas rocas con los granitos adyacentes del Parú y Yureba, así como con rocas del Grupo Cuchivero, aunque se infiere, por el grado de metamorfismo y tectonismo alcanzado por los gneises de Macabana, que deben ser mas antiguos que las unidades mencionadas.

Edad: Precámbrico. Determinaciones de edades radimétricas por el método de isocroma Rb/Sr roca total (Gaudette *et al.*, 1977) permiten postular una recrystalización o reactivación de estos gneises durante la orogénesis Transamazónica: 1911 m.a.aunque puede ser más antigua.

Correlación: Mendoza (*op. cit.*) correlacionan el Augen gneis de Macabana, con otros gneises cuarzo-feldespático-epidótico-biotíticos que afloran en el bajo Ventuari y que parecen extenderse hacia el norte (caños Yaguiguapo y Guapuchi) y hacia el sur hasta los ríos Orinoco, Padamo y Ocamo. Provisionalmente, debido al estado incipiente de datos de campo y laboratorio, los autores estiman que pueden ser equivalentes en tiempo a rocas del Supergrupo Pastora o mas aún a rocas del Complejo de Supamo.

Geoquímica: Los gneises son relativamente altos en Al_2O_3 , CaO, K_2O y MgO, comparados con rocas graníticas promedio y bajos a moderados contenidos de Zr, Rb/Sr.

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Gaudette, H. E. T., J. Olsewski y V. Mendoza, 1977. Preliminary Age Determinations, Amazonas Territory, Venezuela, en M.I.T. Geochronological Lab. Ages Report, 1970-76, p. 113-114.

Issler, R., M. De Lima, R. de Montalvao y G. Da Silva, 1975. Magmatismo alcalino do craton Guianes. *X Conf. Inter-Guianos*, Belém do Pará, Brasil, p. 103-122.

Mendoza V., L. Moreno, F. Barrios, D. Rivas, J. Martínez, P. Lira, G. Sardi y S. Ghosh, 1977. Geología de la parte norte del Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Informe en Progreso). *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 363-404.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)