

PRECAMBRICO

Estado Amazonas

Referencia original: V. Mendoza, L. Moreno, F. Barrios, D. Rivas, J. Martínez, P. Lira, G. Sardi y S. Ghosh, 1977, p. 363.

Consideraciones históricas: Mendoza *et al.* (1977) designan con este nombre a una de las unidades graníticas que describe informalmente como granitos de Parú, Marueta y Yureba rocas graníticas, de colores grises a rosados claros, semimasivas, porfídicas que afloran en las partes medias de los ríos Parú (en Salto Morocoto) y Marueta (en Salto Guacamaya), en el municipio Atabapo del estado Amazonas (Hoja de Cartografía Nacional N° 6928, escala 1:100.000). Estas rocas guardan en común lo siguiente: 1) aspecto semimasivo, 2) grano grueso, porfídicos, 3) presencia y abundancia local de biotita-hornblenda $\pm$ piroxenos, 4) textura hipidiomórfica granular, 5) ausencia de texturas gráfica, mimerquítica y rapakivi, 6) ser intrusivas en rocas tonalíticas a gabroides y estar intrusionadas por aplitas ricas en biotita. Esfena y apatito son los accesorios mas comunes. Las cuarzo - monzonitas de Marueta muestran más esfena y epidoto que las otras. Químicamente, estas rocas graníticas muestran moderados contenidos de SiO_2 , Fe_2O_3 , $\text{Na}_2\text{O/K}_2\text{O}$ y alto de CaO . La extensión real mínima de estas rocas es de unos 3.000 Km^2 . Según lo señalan Mendoza *et al.* (*op. cit.*), la edad inferida para estos granitos es de 1.700 a 1.900 m.a.. Constituyen fuente probable de columbita - tantalita, ilmenita, casiterita, etc.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Mendoza V., L. Moreno, F. Barrios, D. Rivas, J. Martínez, P. Lira, G. Sardi y S. Ghosh, 1977. Geología de la parte norte del Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Informe en Progreso). *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 363-404.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)