


MATARUCA, Miembro (Formación Caujarao)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: C. González de Juana, 1937, p. 205.

Consideraciones históricas: Gonzalez de Juana (1937) menciona por primera vez las "calizas de Mataruca y Rim Rock" para denominar la parte media de la Formación Caujarao. Al sur de la estructura de La Vela, Kavanagh de Petzall (1959) lo define formalmente como miembro medio de la Formación Caujarao. Vallenilla (1961) describió el miembro en la localidad de Caujarao, al sur de Coro.

Localidad tipo: Cerca del caserío de Mataruca, a 2,7 km al este de La Vela, distrito Colina, estado Falcón. Hoja no. 6250, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En la localidad tipo, se caracteriza por la presencia de tres capas de caliza de hasta 8 m de espesor cada una, que forman tres prominentes filas paralelas. Estas calizas están interestratificadas con lutitas y margas muy macrofósilíferas y areniscas micáceas ocasionales (Kavanagh de Petzall, 1959). En la sección del río Coro, la caliza de mayor espesor del Miembro Mataruca es la del sitio de presa. Las calizas son nodulares, impuras y las lutitas son calcáreas y muy microfósilíferas (Vallenilla, 1961).

Espesor: El espesor medido en la estructura de La Vela es de 115 m (Kavanagh de Petzall, 1959). En el río Coro alcanza los 331 m (Vallenilla, 1961).

Contactos: El Miembro Mataruca es concordante tanto en su base como en su tope con los miembros El Muaco y Taratara de la Formación Caujarao, respectivamente.

Extensión geográfica: El miembro se reconoce desde las cercanías de Coro hasta la región de La Vela.

Fósiles: Las margas y calizas son muy ricas en moluscos, ocasionalmente con localidades clásicas, conocidas en la literatura especializada del área Caribe, como por ejemplo la localidad del cementerio de Carrizal. Kavanagh de Petzall (1959) y Vallenilla (1961) reportan extensamente la microfauna de foraminíferos. Wozniak y Wozniak (1987) ponen especial énfasis en los foraminíferos planctónicos.

Edad: De acuerdo a Wozniak y Wozniak (1987), la edad del Miembro Mataruca es de la Zona de *Globorotalia acostaensis*, del Mioceno Tardío.

Paleoambiente: Wozniak y Wozniak (1987) consideran el ambiente como de plataforma con influencia ocasionalmente más marinas.

© E. Cabrera y G. Giffuni, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Gonzalez de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Petzall, C. K. , 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10: 269-320.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Wozniak, J. y M. H. Wozniak, 1987. Bioestratigrafía de la región nor-central de la Serranía de Falcón, Venezuela nor-occidental, *Bol. de Geología*, Venezuela, 16(28): 101-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Italiana*, Boll., 87: 491-503.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

Gamero, G. y Díaz de Gamero L., 1963. Estudio sw una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, Estado Falcón. "Geos", *Univ. Cent. Venez.*, Caracas. (9): 7-44. Reimpreso 1963 en: *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(11): 329-367.

Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull. 35(8): 1850-1878.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiaren orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und NordMarokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(1): 65-81.

Weingeist, 1956. Formación Caujarao en Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.. M. M. H.*, Pub. Esp. 728 p. 44.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)