




## **CRETACICO**

Estado Nueva Esparta

**Referencia original:** H. H. Hess y J. C. Maxwell, 1949, p. 1861-62.

**Consideraciones históricas:** Hess y Maxwell (1949) introdujeron este nombre para designar rocas ígneas ácidas expuestas en los "cerros de Matasiete de la parte oriental de la isla de Margarita".

Taylor (1960) empleó el término en sentido similar a Hess y Maxwell. Jam y Méndez Arocha (1962) emplearon el nombre de ortogneis de Matasiete y González de Juana (1968) lo mencionó como pórfido de granito sódico (ortogneis) de Matasiete.

**Localidad tipo:** Mitad inferior de la ladera occidental del Cerro Matasiete (González de Juana, 1968, Fig. 4).

**Extensión geográfica:** Aflora en una faja continua en la ladera meridional de Matasiete y en las laderas occidentales de los cerros Matasiete y Guayamuri, extendiéndose hacia el norte en los cabos de El Tirano (Puerto Fermín), Cabo Blanco y Punta Montadero.

**Descripción litológica:** González de Juana (1968) la describió como una roca bandeada de color blanquecino con manchas verdosas y grano medio a grueso. El bandeamiento es más delgado y el grano más fino en la parte inferior de la secuencia, donde a veces se convierte en verdadera esquistosidad, en contraste con la parte más alta, donde la roca granítica es realmente granuda y el bandeamiento mucho menor. Petrográficamente está compuesta, de modo muy uniforme, por plagioclasa sódica en una matriz de cuarzo característico; los ferromagnesianos, en proporción generalmente menor al 5%, suelen presentarse alterados a epidoto, actinolita y clorita.

El gneis presenta bandas y vetas de roca verde, unas veces esquistosa y otras de apariencia maciza, de composición feldespático-epidótica, localmente con clinozoisita, que posiblemente representan un episodio volcánico posterior.

**Espesor:** Desconocido.

**Contactos:** Taylor (1960) indicó un contacto de falla, en la base de la ladera occidental de Matasiete, entre el granito y los esquistos de Los Robles, y postuló que el granito de Matasiete es intrusivo en las rocas ultramáficas expuestas en las partes altas de los cerros de Matasiete y Guayamurí. González de Juana (1968 Parada N° 3) señaló la presencia de metasomatitas en el contacto entre el granito y los esquistos de grado bajo del Grupo Los Robles.

**Edad:** Martín Bellizzia (en: Martín Bellizzia *et al.*, 1968) mencionó una edad radiométrica de este granito de  $71 \pm 5$  m.a. (K/Ar).

## **Referencias**

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

Hess, H. H. y J. C. Maxwell, 1949. geological reconnaissance of the Island of Margarita. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Jam, L. P. y M. Méndez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle, Mem.*, 22(61): 51-93.

Martín Bellizzia, C.; C. Ramírez; A. Menéndez; J. R. Ríos y N. Benaím, 1968. Reseña geológica y descripción de las muestras de rocas venezolanas sometidas a análisis de edades radiométricas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 339-355.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 838-893.

## **Bibliografía de Léxicos Anteriores**

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 58(8): 689-702.

Enviar Comentarios



**1st Ed. English**



**Comentarios Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)