




PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: A. R. Reid, 1974?.

Consideraciones históricas: Reid (1972?) introduce este término para designar la Formación mas joven de las cuatro en las que dicho autor divide al Grupo Roraima.

Localidad tipo: Se ubica en Monte Roraima, aproximadamente a unos 87 km al noreste de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, estado Bolívar, (hoja de Cartografía Nacional N° 8031, a escala 1:100.000).

Descripción litológica: Desde su base está constituida esencialmente por ortocuarcitas de grano fino, de colores blanco, crema y rosado. Los granos de arena van de subredondeados a subangulares. Las areniscas se presentan como estratos con espesores de 1 m y pueden ser trazados lateralmente por unos 500 a 600 metros. La estratificación cruzada es común 250 metros por encima de la base, mientras que en la parte inferior de la unidad está ausente. El tope de la unidad presenta poca silicificación, lo cual contribuye a que las areniscas sean muy friables. En general, las arenas de la parte baja de la Formación Matauí están bien escogidas, mientras que en el tope son mediana a pobremente escogidas.

Espesor: Reid (1972) en su columna estratigráfica del Grupo Roraima, Santa Elena de Uairén, estima un espesor de 600 metros par la unidad.

Expresión topográfica: La Formación Matauí forma las prominentes altiplanicies que se extienden a lo largo de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, en la zona limítrofe entre Venezuela, Guyana y Brasil, que son conocidas con el nombre local de "Tepui".

Contactos: La unidad es la mas joven del Grupo Roraima y suprayace concordantemente a la Formación Uaimapué.

Edad: Precámbrico. (Véase: Grupo Roraima).

Paleoambiente: La Formación Matauí es de origen fluvial. La energía fluvial alcanzó un régimen de alto flujo en la génesis de la parte alta de la secuencia. El tamaño del grano estuvo controlado por la fuente de sedimentos ya que los guijarros observados en las areniscas indicaban que la energía no fue el factor en la depositación del tamaño de los granos finos a medios.

Importancia económica: Esta formación, desde el punto de vista geoeconómico, aparentemente no reviste importancia; sin embargo, en el tope de cerro Roraima, existen abundantes vetas de cuarzo, algunas de ellas conteniendo hierro, manganeso y galena.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Reid, A. R., 1972. ???

Reid, A. R., 1974. Stratigraphy of the type area of the Roraima Group, Venezuela. Conf. Geol. Interguayanas, estado Bolívar p: 343-354.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)