


MENECITO, Miembro (Formación San Lorenzo)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Temprano a Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195.

El término fue introducido por Suter (1947), como Miembro de Arcillas de Menecito, para designar la parte superior de la Formación San Lorenzo, del Grupo Agua Salada, pero la descripción original es de Renz (1948). Wheeler (1960, 1963) propone elevar los miembros El Salto y Menecito de la Formación San Lorenzo a categoría de formación, pero esta opinión no tiene acogida.

Consiste de arcillas uniformes, grises a gris azules, con ocasionales intercalaciones de arcillas margosas y glauconíticas. El espesor es de 138,5 m en la sección tipo (Renz, 1948).

El contacto inferior con el Miembro El Salto de la Formación San Lorenzo es de carácter concordante. El superior, con el Miembro Policarpio de la Formación Pozón, es ligeramente discordante en la sección tipo, aunque pasa a concordante en otras localidades (Renz, 1948).

Leriche (1938), citado por Aguilera (1993), identifica varios peces fósiles encontrados en el Miembro Menecito de esta formación: *Acanthias stehline* (= *Squalus stehlini*), *Notidanus tenuidens* (= *Heptanchias tenuidens*), *Oxyrhina* cf. *O. desori* (= *Isurus* cf. *I. desori*), *Prionodon vonderschmitti* (= *Carcharhinus vonderschmitti*) y *Lamna* sp. Esta fauna corresponde a tiburones de la zona batial superior.

Renz (1948) detalla la fauna de foraminíferos de la unidad, que incluye la parte superior de la Zona de "*Uvigerinella*" *sparsicostata*, la de *Robulus wallacei* y la parte inferior de la de *Siphogenerina transversa*. Blow (1959) estudia sistemáticamente los foraminíferos, con especial énfasis en los planctónicos y le asigna una edad que va desde la Zona de *Catapsydrax dissimilis* hasta la parte superior de la Zona de *Globigerinatella insueta* s.l. Esta última corresponde, en términos modernos, a las zonas de *Globigerinatella insueta*, de *Praeorbulina glomerosa* y la parte más inferior de la de *Globorotalia fohsi peripheroronda* (Díaz de Gamero, 1985b). La edad del Miembro Menecito es mayormente Mioceno Temprano, llegando su tope al Mioceno Medio.

Según Renz (1948), el ambiente de sedimentación es marino normal, de unos 200 a 600 m de profundidad, en clima tropical. Blow (1959) amplía esta interpretación indicando que la presencia de conjuntos de foraminíferos arenáceos de interior complejo en varios niveles de la unidad indica períodos de profundización y subsidencia localizados, asociados a flujos turbidíticos. Díaz de Gamero (1996) interpreta estos conjuntos como propios de prodelta en agua profunda, derivados de la desembocadura del río proto-Orinoco en Falcón occidental, análogo a los conjuntos arenáceos de agua profunda estudiados en el Neógeno tardío de Trinidad y que se relacionan con el río Orinoco.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Aguilera S., O. A., 1993. Ictiofauna neogena del noroeste de Venezuela y su relación con el paleo-Orinoco y el paleo-Caribe. Tesis de Doctorado, Universidad Central de Venezuela, 136 p., Inédito.

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Leriche, M., 1938. Contribution a l'etude des poissons fossiles des pays riverains de la Mediterranée americaine (Vénézuéla, Trinité, Antilles, Mexique). *Soc. Paleónt. Suisse*, Mém., 61: 1-42.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bery, E. W., 1936. Tertiary fossil plants from Venezuela. *II U.S. Nat. Mus., Proc.*, 83(2988): 335-360

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Italiana.*, Boll., 87: 491-503.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela. *Smithson. Miscell. Coll.*, 89(11), Publ. 3.223: 44.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihrer Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)