




TERCIARIO (Oligoceno-Mioceno)

Estados Anzoátegui y Monagas

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-a, p. 258.

Consideraciones históricas: Hedberg (1937-a) fue el primero en nombrar la Formación Merecure, a base de afloramientos en el río Querecual; el nombre proviene de un pequeño tributario de éste, la quebrada Merecure. Posteriormente, Hedberg y Pyre (1944), a base de otras secuencias expuestas, dividieron la formación en los miembros Tinajitas, Los Jabillos y Naricual, equivalentes laterales los dos primeros, e infrayacentes ambos al Miembro Naricual.

Hedberg (1950-a) elevó la formación a rango de grupo y amplió su definición. El Grupo Merecure incluía las formaciones Tinajitas, Los Jabillos y Naricual, definidas originalmente como miembros; la Formación Areo de lutitas marinas, equivalentes a la parte inferior no marina de la Formación Naricual; la Formación Periquito, descrita en publicación por Funkhouser *et al.* (1948) como una arenisca maciza, infrayacente a la Formación Oficina en los campos de Anaco, y considerada por Hedberg como equivalente lateral de Naricual; y la Formación Caño Dulce, nombre nuevo introducido para designar capas de conglomerado y arenisca asociadas con carbones y arcilitas abirragadas, expuestas a lo largo del frente montañoso en Guárico.

Este esquema sufrió las siguientes modificaciones posteriores: (a) la Formación Naricual permanece sin alteración; (b) se extendió la definición de las formaciones Los Jabillos y Areo para incorporar areniscas y lutitas equivalentes, incluidas originalmente en la Formación Tinajitas; (c) el nombre Tinajitas se restringe actualmente a las calizas basales de la unidad definida originalmente y se considera como miembro de la Formación Caratas del Grupo Santa Anita, quedando así excluida del Grupo Merecure; (d) las areniscas presentes en el subsuelo al sur se incluyen en el grupo, pero por ser indivisibles reciben el nombre formal de Formación Merecure, y el término Periquito persiste con categoría de informal aplicado en el subsuelo; (e) el nombre Caño Dulce ha sido rechazado por designar una unidad compuesta, que incluía partes de lo que actualmente se llaman formaciones Naricual, Quebradón, Capiricual y Quiamare, Salvador (1964-a, b) comentó brevemente estas modificaciones.

En resumen, el Grupo Merecure se define hoy como un ciclo sedimentario transgresivo-regresivo, caracterizado por una secuencia de arenisca-lutita-arenisca (formaciones Los Jabillos-Areo-Naricual), reconocida principalmente en los afloramientos de la Serranía del Interior. En el subsuelo de la cuenca oriental, exceptuando algunos pozos del norte de Monagas, no se reconoce la Formación Areo con su facies marina de aguas profundas, tal como existe en los afloramientos de la serranía, y por ello no pueden diferenciarse las tres unidades formacionales del Grupo Merecure. En este caso, se emplea el nombre de Formación Merecure para designar todo el intervalo estratigráfico, como en los campos petrolíferos profundos del norte de Monagas, donde constituye los principales reservorios de hidrocarburos.

La nomenclatura del Grupo Merecure no se extiende a la cuenca de Guárico, debido a los cambios laterales en la secuencia sedimentaria.

Véanse [MERECURE, Formación](#); [LOS JABILLOS, Formación](#); [AREO, Formación](#); [NARICUAL, Formación](#).

© V. Campos, 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Funkhouser, H. J., L. C. Sass and H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guárico and Santa Rosa oil fields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(10): 1851-1908.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the Rio Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 239-250. (English ed.)

Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the Rio Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northestern Venezuela. *Asoc. Venez., Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(2): 53-64.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez., Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(6): 153-202.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Borger, H. D., 1962. Case history of Quiriquire field, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 36(12): 2291-2330.

De Sisto, J. 1959. Correlation of the Oficina and Anaco-type sand nomenclatures of the Oficina Formation (con discusión abierta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* 2(3): 38-54.

Kamen-Kaye, M., 1942. Ortiz sandstone and Guarumen sandstone group of northcentral Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 26(1): 126-133.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 690-777.

Renz, H. H.; H. Alberding; K. F. Dallmus; J. M. Patterson; R. H. Robie; N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 890 p. Cap. I (Resumen Geológico): 100-189.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria Petrolera en Venezuela. Cong. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)