

CRETACICO (Maastrichtiense) - TERCIARIO (Eoceno Tardío)

Estado Portuguesa

Referencia original: H. M. Metz, 1960, p. 828.

Metz (1960) introdujo este nombre para designar un conjunto de sedimentos cuya edad se extiende desde el Cretaceo Tardío hasta el Eoceno Tardío, sobrecorrido sobre una sección normal del Eoceno Medio a Tardío en el estado Portuguesa. Según el autor, el término "complejo" se justifica por la imposibilidad de diferenciar y definir las diferentes unidades litológicas, en parte sedimentarias y en parte metamórficas, del conjunto. Metz incluyó en el complejo a las Capas de Río Guache y la Formación Villanueva (Von Der Osten y Zozaya, 1957); según Rod (1960-c), también se han incluido rocas que definitivamente deben excluirse del mismo (formaciones Parángula, Altamira y Paují).

Los afloramientos más característicos de las diversas unidades están en el río Morador, estado Portuguesa, propuesto como "zona tipo" provisional, desde unos 2 kilómetros aguas arriba a partir del punto sobre el río Morador de la carretera Guanare-Acarigua, por unos 8,5 kilómetros de distancia río arriba. La unidad ocupa el Surco de Portuguesa y los contrafuertes andinos entre Guanare y Acarigua. Metz describió "sedimentos estratificados" y "lutitas deformadas y bloques alóctonos incluidos en ellas"; los primeros son depósitos finamente estratificados de grauvacas de color gris oscuro a verde oscuro, subgrauvacas, areniscas cuarzosas y microbrechas, interestratificadas con lutitas grises (1-5 centímetros de espesor); en menor volumen, se destacan brechas gris oscuro a verde, generalmente calcáreas, con fragmentos angulares a redondeados, y conglomerados interestratificados con las lutitas, en capas lenticulares de 5 a 50 centímetros de espesor. Las "lutitas deformadas y bloques alóctonos" afloran, junto con los depósitos estratificados, en contactos de falla o de transición rápida. Las combinaciones más simples son concreciones de caliza muy alterada, fragmentos de fanita y limolita de la Formación La Luna, incluidos en lutitas más jóvenes, pero con faunas de La Luna. Las mezclas de bloques en lutitas incluyen bloques de La Luna, del Paleoceno y del Eoceno Tardío, bloques de caliza con rudistidos del Grupo Cogollo, rocas ígneas y metamórficas. El tamaño de los bloques deslizados varía desde fragmentos hasta bloques de 1 kilómetro de longitud. La unidad constituye un conjunto más antiguo sobrecorrido sobre una secuencia del Eoceno Medio a Tardío, análoga a la de las cuencas de Barinas y Maracaibo. Los afloramientos terminales del complejo están volcados sobre areniscas de la Formación Pagüey (Altamira).

En una cuña de falla de lutitas del complejo, que separa afloramientos eocenos en la quebrada Tilangona, se reconocieron faunas del Maastrichtiense-Paleoceno, que incluyen *Bolivina incrassata*, *Bulimina petroleana*, *Globotruncana* cf. *arca*, *Globorotalites michelineana*, *Bolivinopsis grybowskii*, *Gaudryina bentonensis*, etc. Las lutitas marinas oscuras con *Bulimina jacksonensis*, del Eoceno Tardío, son las rocas más jóvenes del complejo. Estas faunas determinan una edad Maastrichtiense a Eoceno Tardío. El complejo incluye rocas correlacionadas con las formaciones Vidoño, Villanueva, Pagüey (Altamira) y Paují.


Referencias

Metz, H. L., 1960. Un complejo sedimentario-metamórfico sobrecorrido en el estado Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 827-837.

Rod, E., 1960-c. Note on the "sección marina (Eoceno)" and the "sección continental (Eoceno)" described by Harold L. Metz from the State of Portuguesa. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(9): 263-264.

Von Der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del Estado Lara, región de Quíbor (Carta 2.308). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)