




TERCIARIO (Mioceno Medio)

Estado Monagas

Referencia original: E. Rod, 1959-a, p. 784-785.

Consideraciones históricas: Según Lamb y De Sisto (1963), el nombre de Formación Morichito fue empleado en informes privados por Wilson y Hoagland en 1945. La primera publicación del nombre corresponde a Rod (1959-a), quien dió una breve descripción de la formación. En 1963 el nombre apareció en la columna 32 de la tabla de correlación publicada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, sin referencias adicionales. Lamb y De Sisto (*op. cit.*) publicaron una descripción detallada de la sección tipo de la formación, y discutieron sus relaciones estratigráficas.

Localidad tipo: Intervalo entre 2417 y 3710 pies (737 y 1131 m) en el pozo Morichito No. 1 de la Venezuelan Atlantic Refining Co., distrito Maturín, estado Monagas.

Descripción litológica: La formación está compuesta por conglomerados constituidos por peñones, peñas y gravas intercaladas con arenas y limotitas, en una matriz arcillosa de color pardo, ocasionalmente carbonosa a lignatita. Localmente, la matriz puede ser limolítica o arenosa, de grano fino. Los componentes gruesos están formados por fragmentos variados de calizas, lutitas y areniscas de las formaciones del Cretácico y Eoceno de la Serranía del Interior.

Espesor: En la sección tipo, la formación tiene un espesor de 394 m. El espesor máximo está en el orden de los 1650 m, acunándose hasta desaparecer al norte y al sur, a lo largo de una directriz ENE a OSO (LEV, 1970).

Extensión geográfica: La Formación Morichito está restringida a una faja de unos 4 km de ancho por 100 de extensión, entre los campos de Tacat al oeste y Quiriquire al este, a lo largo del frente de montañas del norte de Monagas. Al sur, su límite es la línea de acunamiento contra el Alto de Pirital.

Contactos: En la localidad tipo, la formación yace en contacto discordante sobre sedimentos cretáceos (Lamb y De Sisto, *op. cit.*). En el oeste del área, yace discordantemente sobre la Formación Carapita o unidades cretáceas. Hacia arriba, la formación está cubierta, también discordantemente, por la Formación Las Piedras.

Fósiles: La formación no tiene fósiles, salvo formas redepositadas.

Edad: Por sus relaciones estratigráficas, se le ha asignado una edad Mioceno medio.

Correlación: Por su posición estratigráfica, la Formación Morichito se considera equivalente con la Formación La Pica.

Paleoambientes: La naturaleza de sus componentes litológicos y la morfología del área geográfica que ocupa, indican que el origen de la Formación Morichito es la acumulación de sedimentos de conos aluviales procedentes de la serranía del interior, que rellenaron un valle intramontano separado de los ambientes marinos someros de la Formación La Pica por el Alto de Pirital.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Lamb, J. L. y J. De Sisto, 1963. The Morichito Formation of northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(9): 269-276.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub.* Esp., 4, 756 p.

Rod, E., 1959-a. West end of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 43(4): 772-789.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Regan, J. H., 1938-a. Notas geológicas sobre el campo petrolero de Quiriquire, Distrito Piar, Estado Monagas. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 185-200.

Regan, J. H., 1938-b. Notes on the Quiriquire oil field, Distrit of Piar, State Monagas. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 187-201.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)