

PALEOCENO MEDIO-TARDIO

Consideraciones históricas: (Ex -Miembro Morro del Faro de la Formación Guárico de la Napa Piemontina, L.E.V., 1956, p. 278-281; Peirson *et al.*, 1966, p. 203; L.E.V., 1970, p. 429 y 430; González De Juana *et al.*, 1980, p. 499 y 500; Beck, 1985, p. 547). Vivas y Macsotay (AGUASUELOS INGENIERIA, 1990 y Vivas y Macsotay (1995-d) separan ésta unidad litoestratigráfica de la Formación Guárico y la elevan a rango de formación. Desde el punto de vista paleogeográfico la Formación Morro del Faro forma parte de la cobertura sedimentaria de la Napa de Villa de Cura y no de la Napa Piemontina (Vivas y Macsotay, 1995-d).

Localidad tipo: Su localidad tipo es el morro El Faro, 5 km al noroeste de la ciudad de San Juan de Los Morros, estado Guárico (Peirson *et al.* 1966; Bell 1968-b, p. 332; L.E.V., 1970, p. 430).

Descripción litológica: La formación está constituida por 300 a 350 m de calizas biostromales, biodetríticas con abundancia de foraminíferos, microalgas y otros organismos carbonáticos, dispuestas en capas submétricas a plurimétricas. Las calizas son macizas, compactas de color gris claro que meteoriza a gris azulado.

Espesor: De 300 a 350 m.

Contactos: En la región de San Juan de Los Morros, la Formación Morro del Faro suprayace en contacto de discordancia angular a la Asociación Metamórfica de Villa de Cura (Esquistos de Santa Isabel) en los sectores de "Los Baños Termales de San Juan" y "La Puerta" (morro La Capilla); en su localidad tipo el contacto inferior de la formación está en relación de hiatus con la infrayacente Formación Escorzonera. En el sector de La Puerta de San Juan, curva del río Guárico, la Formación Morro del Faro, infrayace en relación de hiatus a la Formación Caramacate. Más hacia el este, en la región de quebrada Honda-San Sebastián, la unidad aflora como megaolistolitos dentro de la Formación Caramacate.

Fósiles: Foraminíferos bentónicos grandes, los más comunes con taxonomía corregida por Furrer (comunicación escrita, 1997) son: *Actinosiphon barbadensis* (Vaughan), *Ranikothalia catenula* (Cushman y Jarvis), *Ranikothalia bermudezi* (Palmer), *Discocyclina* (D.) *barker* Vaughan y Cole, *Discocyclina* (D.) *caudriae* Vaughan, *Bontourina saturniformis* M. de Cizancourt y *Laffitteina* sp. La muestra V.V.-606 tomada por los suscritos (en AGUASUELOS INGENIERIA, 1990) de la cima del morro El Faro, corresponde a la parte superior de la Formación Morro del Faro y al microscopio es una biopelmicrita arcillosa con frecuentes algas dasycladaceas y foraminíferos (*Actinosiphon barbadensis* var. *caudriae* de Cizancourt, *Helicolepidina* sp. y *Miliolidae* no identificados). La muestra V.V.-605, tomada de la parte inferior del morro El Faro (cerca de la base de la formación) es una biopelmicrita de textura wackestone, arcillosa, con abundantes fragmentos de algas incrustantes y briozoarios (no se observó fauna diagnosticable).

Edad: Esta unidad fue muestreada por Caudri (1944) y Cizancourt (1951), quienes establecen la correlación y la edad de la misma. En base a la edad concomitante sugerida, del conjunto, es Paleoceno (Seller De Civrieux; L.E.V., 1956, p. 386-391, y más precisamente Paleoceno medio Tardío (Furrer, *op. cit.*).

Paleoambiente: Depósitos de bancos calcáreos, biostromales de plataforma externa, formados sobre un arco volcánico insular.

© V. Vivas y O. Macsotay, 1997

Referencias

AGUASUELOS INGENIERIA, 1990. Modernización de los datos geológicos en el frente de montañas, preparado para CORPOVEN S. A., *Informe interno*, 5 tomos, 1023 pp. 126 lams. 53 fig.

Beck, C., 1985. Las Napas de Aragua- Cadena Caribe Central y la historia mesozoica del margen sur del Caribe a lo largo del meridiano de Caracas. *Géodynamique des Caraïbe*. Symposium Paris, 5-8 Février 1985. Editions Technip, 27, rue Ginoux, 75015 Paris, p. 541-551.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.* Caracas, 9(18): 291-440.

González De Juana, C.; J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. 2 tomos, Ediciones Foninves, Caracas, 1030 pp.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 4, 756 p.

Peirson, A. L; A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of North-Central Venezuela. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inf., 9(7): 183 -224.

Vivas, V. y O. Macsotay, 1995-d. Napa Piemontina: Unidades pre y sin-colisión de las placas Caribe y Suramericana. Cretácico (Senoniense) a Eoceno medio, Venezuela Nor-Central". *IX Congreso Latineamericano de Geología* Caracas. Excursión Geológica N° 7 (inédita).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)